

Mirídeos Neotropicais, CCCXXXIII: Descrições de Oito Espécies Novas e Sinonímia de *Ellenia* Reuter (Hemiptera)

JOSÉ C. M. CARVALHO*

Museu Nacional, Rio de Janeiro, RJ

Manuscrito recebido em 24 de março de 1990

ABSTRACT

The author describes eight new species of Miridae (Hemiptera) as follows: *Adfalconia costaricana* n. sp., Costa Rica, El Salvador; *A. nigra* n. sp., Nicaragua; *Falconia veneciana* n. sp., Colombia; *Neofurius boliviensis* n. sp., Bolívia; *Pachypoda chimborazensis* n. sp., Ecuador; *P. costaricensis* n. sp., Costa Rica; *Pycnoderes centralis* n. sp., Nicaragua, El Salvador; *Sixeonotus nicaraguensis* n. sp., Nicaragua. Synonymy between *Ellenia cuneata* (Stål, 1860) and *E. fortinensis* (Distant, 1983) is established. Mention is also made on *E. ordinata* (Distant, 1893). Drawings of habitus and male genitalia are included.

Key words: eight new species, Miridae, *Ellenia*

INTRODUÇÃO

O autor revendo material de sua coleção de referência e hemípteros mirídeos enviados para estudo pelo colega J. Maes, de Leon, Nicarágua, encontrou espécies novas que são descritas no presente trabalho.

Consultando a literatura também se refere a modificações sobre sinonímia.

Os desenhos que ilustram o texto são de autoria de Paulo Roberto Nascimento, Maria Lilia Gomide da Silva e Luiz Antonio Alves Costa, supervisionados pelo autor.

Adfalconia costaricana n. sp.

(Fig. 1)

Caracterizada pela coloração do segmento II da antena e pela morfologia da genitália do macho.

Fêmea: comprimento 3,0 mm, largura 1,2 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vértice 0,38 mm. **Antena:** segmento I, com-

primento 0,2 mm; II, 0,9 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,3 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm, largura na base 1,1 mm. **Cúneo:** comprimento 0,2 mm, largura na base 0,08 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo preta com áreas pálido-amareladas; cabeça (exceto mancha mediana apagada no vértice e gula) e antena (exceto extremidade apical do segmento II) pálido-amareladas, membrana fusco-clara, rostro pálido.

Lado inferior do corpo preto, coxas e pernas pálido-amareladas.

Corpo recoberto por pubescência semiadpresiva, rostro atingindo o ápice do mesoesterno.

Macho: desconhecido.

Holótipo: fêmea, Costa Rica, Puntarenas, Monteverde area, 6-14.VI.1973, Erwin & Hevel Central American Expedition, na coleção do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos da América, Washington, D.C. **Parátipos:** macho, 2 fêmeas, mesmas indicações que o tipo; 2 fêmeas, El Salvador, La Libertad, Hacienda Argentina, 17.VI.1960, J. Bechyné, na coleção do autor.

* Pesquisador do CNPq.