

Mirídeos Neotropicais, CCCLIII: *Sericophanisca* n. gen. *curacaoensis* n. sp. da Ilha de Curaçao (Hemiptera)

JOSÉ C. M. CARVALHO*

Museu Nacional, Rio de Janeiro

Manuscrito recebido em 11 de abril de 1991

ABSTRACT

The author describes *Sericophanisca* n. gen., *S. curacaoensis* n. sp., from Santa Cruz Bay, Curaçao. Figure of habitus of female is presented.

Key words: New genus species Curaçao, figure

INTRODUÇÃO

Observando a coleção de referência do autor, novo gênero e espécie de Curaçao, Ilhas Holandesas, foi encontrado e está sendo descrito no presente trabalho.

Sericophanisca n. gen.

Orthotylinae, Ceratocapsini. Fêmea alongada, braquíptera, com abdome estreitado na base, corpo com pubescência muito curta e escassa.

Cabeça pontuda, arredondada na frente e no vértice que é marginado, olhos contíguos ao pronoto, levemente deprimidos, clipeo pouco saliente; rostró alcançando o meio do mesoesterno (dificilmente calculável no exemplar tipo); antena com segmento I mais curto que o vértice, segmento II cerca de cinco vezes mais longo que o I, III e IV engrossados para o ápice (a antena é do tipo Ceratocapsini).

Pronoto arredondado para cima e na extremidade apical, calos obsoletos, colar deprimido, porção posterior do disco levemente convexa; mesoescuto coberto, escutelo grande, plano.

Hemiélitros braquípteros, fendidos no meio apicalmente; abdome visto de cima, visivelmente

carenado dos lados (conexivo), afilado para a base e para o ápice.

Lado inferior com coxas curtas, fêmures e tíbias longos, pouco pilosos (pilosidade simples e curta, espinhos das tíbias ausentes).

Espécie tipo: *Sericophanisca curacaoensis* n. sp.

Difere dos demais gêneros de Ceratocapsini pela conformação do pronoto e da cabeça.

O nome genérico é devido a semelhança com *Seracophanes* Reuter, 1876.

Sericophanisca curacaoensis n. sp.

Caracterizada pela coloração do corpo.

Fêmea: comprimento 4,0 mm, largura (nos hemiélitros que são braquípteros) 0,6 mm, no abdome (meio) 1,0 mm. *Cabeça*: comprimento 0,6 mm, largura 0,7 mm, vértice 0,38 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 1,0 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,4 mm. *Pronoto*: comprimento 0,5 mm, largura na base 0,6 mm. Desprovida de cúneo.

Coloração geral do corpo pálido-amarelada ao castanho-claro; hemiélitros com pruinoseidade prateada no meio, braquípteros, mais claros no ápice, clavo com mancha no terço basal (considerando o escutelo) ou em seu meio (todo o

*Pesquisador do CNPq.