

Macho: Comprimento 5,1 mm, largura 1,8 mm. **Cabeça:** comprimento 0,4 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,28 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,5 mm; II, 1,7 mm; III 0,9 mm; IV, 0,8 mm. **Pronoto:** comprimento 0,8 mm, largura na base 1,6 mm: **Cúneo:** comprimento 0,90 mm, largura na base 0,60 mm (holótipo).

Colocação geral do corpo pálido-amarelada; região central do clavo e do endocório (somente em alguns exemplares) côr de abóbora; membrana fusca, nervuras mais claras; olhos castanhos. Segmento II da antena no ápice e segmentos III e IV fuscus.

Lado inferior do corpo pálido-amarelado, mais claro, rostro com extremidade apical negra.

Rostro alcançando o ápice ou indo um pouco além das coxas posteriores, pubescência adpressa, espinhos das tíbias posteriores castanhos.

Genitália: Vésica com lobos tendo minúsculos espinhos na extremidade, tudo seminal distal longo e um espículo esclerosado (Fig. 2). Parâmero esquerdo (Fig. 3) bastante curvo, com lobo basal serreado, cerdas dorsais e uma dilatação preapical. Parâmero direito (Fig. 4) pouco menor, com extremidade apical afilada e cerdas dorsais.

Fêmea: com aspecto geral do macho, completamente pálido-amarelada, maior, comprimento até 5,6 mm, largura 2,0 mm, vértice 0,38 mm, pouco mais robusta.

Holótipo: macho, Ceylon, N.E. District, Kanda-ela Reservoir, 5.6 mi SW Nuwara Eliya, 6.200 ft, 10-21 Feb. 1970, Davis & Rowe, na coleção do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos da América, Washington, D.C.

Parátipos: 10 machos e 18 fêmeas, mesmas indicações que o tipo, na coleção acima e do autor.


Difere das outras espécies do gênero pela morfologia da genitália do macho.

O nome específico é alusivo a Taprobana, nome dado a região por Camões nos Lusíadas.

***Microoculis nuwarensis* n. sp.**
(Figs. 5 - 7)

Caracterizada pela coloração do endocório e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: Comprimento 4,6 mm, largura



Microoculis nuwarensis n. sp.: Fig. 5 - vésica; Fig 6 - parâmero esquerdo; Fig. 7 - parâmero direito.

1,1 mm. **Cabeça:** Comprimento 0,4 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,28 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,6 mm; II, 1,9 mm; III, 1,2 mm; IV, 0,8 mm. **Pronoto:** comprimento 0,3 mm, largura na base 0,9 mm. **Cúneo:** comprimento 0,90 mm, largura na base 0,30 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo pálido-amarelada com hemiélitros pálido-esverdeados; região apical do cório, ao lado da comissura corial com mancha verde transversal; membrana fusca, aréolas esclerosadas, pálido-esverdeadas na região apical.

Lado inferior do corpo pálido-amarelada, mais clara.

Área areolar da membrana menos esclerosada que o cúneo, rostro alcançando o ápice das coxas posteriores ou pouco além, fêmur III afilado para a extremidade, espinhos das tíbias III praticamente da mesma grossura das mesmas.

Genitália: vésica (Fig. 5) com dois lobos esclerosados bem nítidos, porção seminal apical alongada e lobos membranosos. Parâmero esquerdo (Fig 6) curvo no ápice, com um lobo subapical e cerdas dorsais. Parâmero direito (Fig. 7) com duas curvaturas e dentículos na periferia.