



Рис. 8—14. *Megalocoleus* Fieb.

8—13 — *M. hirsutus* sp. n.: 8 — правый парамер, 9, 10 — левый парамер в двух положениях, 11 — тека, 12, 13 — эдеагус в двух положениях; 14 — *M. hungaricus* Wgn., вершина эдеагуса.

Правый парамер (рис. 8) удлинненный, с маленьким гипофизом. Гипофиз и вырост чувствительного бугорка левого парамера (рис. 9, 10) короткие, одинаковой длины. Эдеагус (рис. 12, 13) тонкий, с длинным прямым вершинным отростком.

М а т е р и а л. Азербайджанская ССР: Али-Байрамлинский р-н, с. Аджикабул, 23—24 V 1969 (Гидаятов), 1 ♂, 7 ♀; Зангеланский р-н, с. Вежнали, 19 V 1982 (Эффенди), 2 ♂ (в том числе голо-тип), 5 ♀; Елизаветполь (=Гянджа), с. Козлук, 8 VII 1913 (Арцимович), 1 ♂, 2 ♀; Шуша, урочище Урень-Қала, 16, 17 V 1901 (Захваткин), 1 ♀. Иран: Астрабад (=Горган), 20 IV 1914 (Кириченко), 4 ♂, 2 ♀.

По форме и окраске тела близок к *M. hungaricus* Wgn. У последнего 2-й членик усиков более длинный (1.2 мм), вершинная часть эдеагуса более расширена, вершинный отросток короткий и изогнутый

***Psallus samedovi* Drapolyuk, sp. n.**

♂ темно-коричневый, основание кунеуса светлое, у некоторых экземпляров внешние углы кориума и кунеус красновато-коричневые. Перепоночка буроватая, жилки светло-серые, пятно у вершины малой ячейки светло-дымчатое. 1-й членик усиков коричневый или красновато-коричневый, со светлой вершиной и двумя щетинками на внутренней поверхности. Остальные членики усиков желтые. Бедря коричневые или красновато-коричневые, со светлой вершиной и нечеткими черными точками близ нее; голени грязновато-белые, с черными щетинками и черными точками при их основании. Лапки коричневые, 3-й членик темно-коричневый. Опушен светлыми блестящими волосками и серебристыми чешуйками.