

et de leurs épines, des antennes, de la pubescence (*Parahypsitylus*, *Hyoidea*), de la longueur comparée des articles 2 et 3 des tarses postérieurs (*Pachylops* : 2^e article aussi long ou plus long que le 3^e). De plus, la morphologie des genitalia éloigne l'espèce étudiée de celles de ces genres (sauf, peut-être, le genre *Hyoidea*).

2. — La morphologie des genitalia, tout particulièrement la forme assez compliquée des paramères, la division et la denticulation nettes des baguettes sclérifiées de la vésica, conduit, compte tenu des critères cités plus haut, à envisager l'appartenance de l'espèce au genre *Orthotylus*. Ce genre, vraisemblablement l'un des plus complexes de la sous-famille des Orthotylinae, comprend un grand nombre d'espèces (90 dans la région paléarctique) réparties entre six sous-genres qui diffèrent principalement par la pubescence, la forme des paramères et des baguettes sclérifiées de la vésica.

Si l'espèce décrite est admise dans ce genre, il convient de la ranger dans un sous-genre nouveau que nous décrivons ci-dessous :

Parapachylops n. subg. Sous-genre se distinguant du sous-genre nominatif (*Orthotylus* s. str. Fieber 1859, espèce-type *O. nassatus* F.) et des autres sous-genres déjà décrits (cf. Wagner 1973) par une pubescence comprenant uniquement des soies semi-érigées brunes ou d'un brun foncé, des paramères de forme compliquée (fig. 8-13) ; les baguettes sclérifiées de la vésica nettement divisées et denticulées (fig. 14). Espèce-type : *O. armoricanus* n. sp. *Parapachylops* se distinguera des autres sous-genres grâce à la clé suivante :

CLÉ DES SOUS-GENRES D'ORTHOTYLUS

- | | |
|---|--|
| 1. — Tous les poils semi-érigés blanchâtres ou d'un blanc-jaunâtre. Poils couchés absents ou brunâtres | 2 |
| — Poils semi-érigés noirs ou bruns, rarement clairs : dans ce cas il y a des poils squamiformes nets, à leur base | 3 |
| 2. — Scutellum d'une seule couleur, claire ou sombre. Yeux proches de l'angle antérieur du pronotum. Paramères de forme variable, souvent compliquée. Baguettes de la vésica le plus souvent divisées et denticulées | <i>Orthotylus</i> s. str. Fieber, 1859 |
| — Scutellum bicolore. Yeux un peu éloignés de l'angle antérieur du pronotum. Paramères de forme simple. Baguettes de la vésica non divisées et non denticulées | <i>Neomecomma</i> Southwood, 1953 |
| 3. — Seulement des poils semi-érigés | 4 |
| — Deux sortes de poils en général : poils semi-érigés et poils couchés clairs parfois squamiformes | 5 |
| 4. — Poils semi-érigés en général noirs. Rostre dépassant les hanches postérieures. Paramères de forme simple. Baguettes de la vésica divisées et denticulées | <i>Litocoris</i> Fieber, 1861 |
| — Poils semi-érigés bruns ou d'un brun foncé. Rostre atteignant à peine les hanches intermédiaires, les articles 3 et 4 plus épais que l'article 2. Paramères de forme compliquée. Baguettes de la vésica divisées et denticulées | <i>Parapachylops</i> n. subg. |