

УДК 595.754 (47+519.3)

И. М. Кержнер

### НОВЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СЛЕПНЯКИ (HETEROPTERA, MIRIDAE) ИЗ СССР И МОНГОЛИИ

[I. M. KERZHNER. NEW AND LITTLE-KNOWN CAPSID BUGS  
(HETEROPTERA, MIRIDAE) FROM THE USSR AND MONGOLIA]

Статья основана на материалах, хранящихся в Зоологическом институте АН СССР, Ленинград (далее сокращенно ЗИН), а также на сборах Советско-Монгольских зоологических экспедиций, хранящихся там же и в Биологическом институте АН МНР, г. Улан-Батор. Голотипы новых видов хранятся в ЗИН.

За предоставление типов из зарубежных музеев и личных коллекций автор благодарен М. Байеру (Prof. M. Beier, Wien), Г. Зайденштюкеры (G. Seidenstücker, Eichstatt/Bayern) и М. Майнандеру (Dr. M. Meinander, Helsinki).

Род DIMORPHOCORIS Reuter, 1890

Подрод PEDETOCORIS, subgen. n.

Самцы и самки короткокрылые. Тело опушено только светлыми волосками. Переднеспинка с четко отделенным плоским шейным кольцом. Правый парамер с острым косым выростом от середины внутреннего края.

Типовой вид подрода: *Dimorphocoris pedetes* Kerzhner, 1964.

Кроме *D. pedetes*, описанного из восточной части Карагандинской области, к новому подроду относятся также *D. atrans*, sp. n. (Русский Алтай) и *D. mongolicus*, sp. n. (Гобийский Алтай). Все три вида приурочены к горным степям и обитают на щербистых и каменистых склонах. Оба новых вида живут на *Agropyrum cristatum*; как кормовое растение *D. pedetes* указан *Elymus lanuginosus*, что однако нуждается в проверке.

В подроде *Dimorphocoris* s. str. самцы полнокрылые, опушение чаще всего по крайней мере с примесью черных волосков, шейное кольцо не отделено, правый парамер без выроста. Подавляющее большинство видов обитает в Средиземноморье, два вида в степях Казахстана, а один (*D. fuscus*) имеет изолированный участок ареала на Алтае и в прилегающих частях Монголии. Кормовые растения (в основном *Festuca* и *Stipa*), известны лишь для очень немногих видов.

В подроде *Homocoris* Fuente, так же как и у *Pedetocoris*, оба пола короткокрылые, но опушение всегда целиком или отчасти состоит из черных волосков, шейное кольцо не выражено, правый парамер без выроста. В подроде 5 видов, все из Средиземноморья, кормовые растения неизвестны.

#### ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ПОДРОДА PEDETOCORIS

- 1 (2). 1-й членик усиков в вершинной половине (♂) или почти целиком желтовато-белый. У ♂ голова, переднеспинка, щиток и брюшной ободок белые, лишь отчасти с бледно-буроватыми пятнами. У ♀ ши-