

3 группы близких видов, из которых одна включает только *H. visci* Put., вторая объединяет *H. aenescens* Reut. и *H. fasciatus*, sp. n. (в случае разделения рода на подроды за этой группой останется название *Pherolepis*), а к третьей принадлежат *H. amplus* Kulik и *H. kiritshenkoi*, sp. n.

Виды этого рода могут быть определены по следующей таблице:

- 1 (2). Тело правого парамера почти треугольное. Эдеагус с простой возвратной ветвью. Вся верхняя сторона тела покрыта волосками и серебристыми чешуйками. 3-й и 4-й членики усиков, вместе взятые, слегка длиннее 2-го. Щетинки на 1-м членике усиков такой длины, как толщина членика. Голени с бурыми пятнами, выходящие из них щетинки слегка длиннее толщины голени *H. visci* (Put.).
- 2 (1). Тело правого парамера почти прямоугольное. Возвратная ветвь эдеагуса с 1—2 отростками или по крайней мере зубцами. Переднеспинка голая или с простыми волосками, без чешуек. 3-й и 4-й членики усиков, вместе взятые, короче 2-го. Щетинки на 1-м членике усиков короче толщины членика или отсутствуют. Голени без бурых пятен, щетинки на них короче толщины голени.
- 3 (6). Возвратная ветвь эдеагуса с двумя боковыми отростками или маленькими зубчиками. Вся поверхность надкрылья (кроме перепоночки) покрыта длинными светлыми волосками и серебристыми чешуйками. Переднеспинка с волосками, хотя бы очень короткими. 2-й членик усиков короче ширины головы. Живут на *Salix*.
- 4 (5). Волоски на переднеспинке (см. спереди и сверху) очень короткие, плохо заметные, короче толщины 2-го членика усиков в основании. Ноги, 1-й и основание 2-го членика усиков грязно-желто-бурые. Перепоночка короче, выступает за кунеус менее чем половиной своей длины. Щиток к середине и основанию опущен явно реже, чем у боковых краев *H. amplus* (Kulik).
- 5 (4). Волоски на переднеспинке длиннее, явно более длинные, чем толщина 2-го членика усиков. Ноги, 1-й и основание 2-го членика усиков красные. Перепоночка длиннее, выступает за вершину кунеуса половиной своей длины. Щиток почти равномерно опущен *H. kiritshenkoi*, sp. n.
- 6 (3). Возвратная ветвь эдеагуса с одним боковым отростком. Кунеус и задняя часть кориума резко отличаются по опушению от остальной части надкрылья, они голые или только с крайне короткими волосками. Переднеспинка голая. Длина 2-го членика усиков больше или равна ширине головы. Живут на *Ulmus*.
- 7 (8). Голова опущенная (волоски легко стираются). Чешуйки на надкрыльях распределены почти равномерно на всем пространстве от основания надкрылья и почти до уровня вершины клавуса. Кроме чешуек, на надкрыльях имеются чрезвычайно короткие простые волоски *H. aenescens* (Reut.).
- 8 (7). Голова голая. Чешуйки на надкрыльях собраны в отдельные хорошо ограниченные пятна; совокупность последних образует перевязь, передний край которой лишь слегка выдается вперед за уровень вершины щитка, а задний край лежит на уровне середины общего шва; основание надкрыльй голое. Простые волоски на надкрыльях отсутствуют *H. fasciatus*, sp. n.

Hypsloecus visci (Puton, 1888).

Известен только из Франции, ФРГ, ГДР и СССР (указан для Крыма и Кавказа, но я видел материал только из Крыма). Живет на *Viscum album*. Гениталии ♂ как на рис. 1.