

Длина тела ♂ 5.5—6, ♀ 6—6.8; ширина тела ♂ 2.5—2.6, ♀ 2.7—3 мм.
С С С Р, о. Кунашир: вулкан Головнина, 26 VII 1973 (Кержнер), 1 ♂, голотип, 3 ♀; Алексино, 29 VII 1973 (Кержнер), 2 ♀; там же, 7 VII 1962 (Коновалова), 1 ♂; Серноводск, 26 VIII 1973 (Кержнер), 2 ♀; 7 км южнее Серноводска, 17 VII 1973 (Кержнер), 1 ♀. Живет на Kalopanax septemlobum (Araliaceae).

Ранее (Криволуцкая, 1973) описанный здесь вид был ошибочно указан с Кунашира под названием *Lygus flavigenis*. Изученные мною 2 ♀ *L. flavigenis* из Японии близки к данному виду, но отличаются плоским щитком, светло-желтыми, почти белыми щеками и уздечками, меньшими размерами и другими признаками.

Описанные здесь 3 новых вида и *Lygus flavigenis* Ног. из Японии образуют группу видов недостаточно ясного положения. По окраске щитка и некоторых других частей тела, форме правого парамера, характеру пунктировки они наиболее близки к *Orthops viscidula* Put., *O. coccineus* Ног. и *O. cervinus* H.-S., в связи с чем я и отношу их к роду *Orthops*. Однако, положение последних трех и других живущих на деревьях видов рода *Orthops*, а также их взаимоотношения с близкими родами *Salignus*, *Agnocoris* и *Pinalitus* сами по себе требуют специального изучения. Как указал Келтон (Kelton, 1955) род *Orthops* в современном его объеме гетерогенен и типичными представителями его являются лишь виды, живущие на травянистых растениях (*O. kalmii* L., *O. foreli* Fieb. и близкие к ним виды).

Orthops festivus Kerzhner, sp. n. (рис. 30—35).

Мельче и стройнее предыдущего. Голова и переднеспинка в очень коротких и тонких редких светлых волосках. Надкрылья густо покрыты прямыми бледно-буроватыми и слегка изогнутыми серебристыми прижатыми волосками. Низ брюшка в коротких светлых волосках.

Голова короткая, блестящая, желтая; наличник и верхняя губа черные; обычно середина лба и 2 пятна близ заднего края темени бурые. Темя с невысоким килем по всему заднему краю, у ♂ в 1.1, у ♀ в 1.2 раза шире глаза. Усики тонкие, очень коротко опущены. 1-й членник желтый, полное или неполное кольцо на его вершине и косая продольная полоса на нижней стороне буроватые. 2-й членник желтый, очень узко затемнен на вершине. 3-й и 4-й членники черные или темно-бурые. Хоботок желтый, на вершине черный, доходит до задних тазиков.

Переднеспинка приблизительно в 1.6 раза шире головы, вся поверхность ее, кроме шейного кольца и мозолистых возвышений, в густой глубокой крупной пунктировке. Шейное кольцо матовое, плоское, его длина обычно незначительно превышает толщину 2-го членника усиков, реже превышает ее в 1.5—2 раза. Основной фон окраски желтый или грязно-желтый, мозолистые возвышения и пятна в задних углах или полоса вдоль заднего края или почти вся задняя доля, кроме ее срединной части, темно-бурые или черные. Шейное кольцо всегда светлое, узкая полоска на заднем крае переднеспинки беловатая.

Щиток высоко приподнятый, гладкий, сильно блестящий, черный, продольная полоса по всей его длине, середина мезоскутума и боковые углы скutellума желтые. Основание щитка в густых светлых волосках, остальная поверхность его почти голая.

Надкрылья заметно заходят за вершину брюшка. Клавус и дистальная половина кориума бурые, базальная половина кориума и кунеус грязно-желтые, вершинная часть кунеуса, его наружный край, а обычно и наружный край дистальной половины кориума светло-красные. Надкрылья шероховатые, но не пунктированные. Перепоночка темно-серая, со светлыми, не очень явственными пятнами как у предыдущего вида, жилки беловатые.