

Низ тела желтый, бока средне- и заднегруди и брюшка иногда буроватые. Площадка пахучих желез беловато-желтая. Ноги желтые, задние бедра обычно с 2 красноватыми кольцами перед вершиной, 3-й членник лапок темно-бурый. Щетинки на голенях бурье, темных пятен при их основании нет.

Измерения (1σ , 1 ♀; $1 = 0.01$ мм): ширина головы у ♂ 105, у ♀ 110; ширина темени у ♂ 37, у ♀ 42; длина члеников усиков, начиная с 1-го у ♂ 55, 190, 80, 75; у ♀ 57, 190, 90, 80; длина переднеспинки у ♂ 93, у ♀ 102; ее ширина у ♂ 160, у ♀ 185; длина задней голени у ♂ 235, у ♀ 260; длина тела измеренного ♂ 470, ♀ 550.

Левый параметр как на рис. 30—31. Правый параметр (рис. 32—33) со сравнительно узким гипофизом. Эдеагус (рис. 34—35) с серповидно изогнутой спикулой и менее склеротизованной, чем у предыдущего вида, лопастью.

Длина тела ♂ 4.6—5.1, ♀ 4.9—5.5, ширина ♂ 1.8—1.9, ♀ 2.2—2.3 мм.

СССР, о. Кунашир: вулкан Головнина, 24 VII 1973 (Кержнер), 2 ♂, в том числе голотип; Алешино, 29 VII 1973 (Кержнер), 2 ♂, 6 ♀; Третьяково, 4 VIII 1973 (Кержнер), 1 ♀; Серноводск, 26 VIII 1973 (Кержнер), 1 ♀; Южно-Курильск, 24 VIII 1973 (Кержнер), 1 ♂. Живет на *Kalopanax septemlobum*.

Хорошо отличается от *O. nigrescens* sp. p. меньшими размерами, окраской надкрылий, строением гениталий.

Orthops japonicus Kerzhner, sp. p. (рис. 36—40).

Сравнительно светло окрашенный вид. Голова и переднеспинка покрыты бурыми короткими тонкими волосками. Надкрылья густо покрыты прижатыми прямыми тонкими черными и слегка изогнутыми более толстыми светлыми волосками. Низ брюшка в очень коротких, с трудом различимых светлых волосках.

Голова короткая, блестящая, красновато-желтая; наличник в вершинной половине черный, в базальной — темно-красный или буроватый. Темя с очень низким, едва различимым килем по заднему краю, у ♂ в 2 раза шире глаза. Усики тонкие, очень коротко опущены. 1-й членник грязно-желтый, на вершине, в основании и на всей нижней и внутренней стороне черный. 2-й и 3-й членники черные с узким желтоватым кольцом в основании, 4-й — черный. Хоботок красновато-желтый, на вершине черный, доходит до заднего края средних тазиков.

Переднеспинка светло-желтая, без темного рисунка, почти в 2 раза шире головы, вся поверхность ее, кроме шейного кольца и мозолистых возвышений, в очень мелкой и неглубокой, с трудом различимой пунктиривке. Шейное кольцо матовое, плоское, слегка длиннее толщины 2-го членика усиков.

Щиток почти плоский, гладкий, бурый, все основание его и узкая продольная полоса посередине желтые.

Надкрылья сравнительно недалеко заходят за вершину брюшка. Клавус и кориум грязно-буровато-красные. Кунеус беловато-желтый, вдоль основания его идет сужающаяся кнаружки темно-красная полоса, которая оставляет узко светлой границу кориума и кунеуса, но продолжается ковнутри в заднем углу кориума; вершина кунеуса узко темно-красная. Перепоночка черноватая, жилки беловатые.

Низ тела светло-желтый, местами слегка красноватый, бока брюшка с узкой размытой красной полосой. Ноги желтые, задние бедра с 2 красными кольцами перед вершиной и отчасти красноватой нижней стороной, 3-й членник лапок темно-бурый. Щетинки на голенях бурье, тонкие, темных пятен при их основании нет.

Измерения голотипа ($1 = 0.01$ мм): ширина головы 107; ширина темени 50; длина члеников усиков начиная с 1-го 69, 190, ?, ? (у пар-