

на задней доле, кроме того, имеются густые короткие прилегающие волоски. Щиток темно-бурый, с продольной желтой полосой, сужающейся кзади, в 1,25 раза шире длины; опушение как на задней доле переднеспинки.

Надкрылья буроватые, клавус и кориум с круглыми желтоватыми пятнами, которые в задней половине кориума обычно сливаются в большие расплывчатые светлые пятна, эмболиум желтоватый, жилки на кориуме иногда красноватые, в области расположения пятен густых черных щетинок кориум темно-бурый. Кунеус грязно-желтый, с расплывчатыми светло-бурыми и красными пятнами. Перепоночка темно-серая, с круглыми желтоватыми пятнами и красной (хотя бы отчасти) жилкой. Кожистая часть надкрылий опушена волосками двух типов: густыми короткими и редкими длинными, в зависимости от освещения волоски кажутся черными или серебристыми. На боковом крае надкрылий почти все волоски светлые, причем к основанию кориума они становятся более длинными, редкими и торчащими.

Тазики желтые. Бедра желтые, близ вершины бурые, обычно еще с отдельными красноватыми или буроватыми пятнышками. Голени бурые, передние и средние с узким желтым кольцом вблизи основания и широкожелтые в вершинной половине (но не на самой вершине), задние голени окрашены, как остальные (у светлых самок), или почти целиком темные.

Низ груди и брюшка темно-бурый по краю и желтый посредине. Гениталии самца — рис. 17—22.

Длина самца 8,1—9,2 мм, самки 9,6—10,3; ширина самца 2,6—2,9, самки 3,3—3,5 мм.

Прим., Хасанский р-н: Рязановка, 10 км северо-восточнее Сухановки, 30—31. VII 1982 (К.), 28 экз. (в том числе голотип, самец, 30.VII); Андреевка, 8 км южнее Сухановки, 6.VII 1978 (Кс.), 2 самца; там же, 4 и 17.VIII 1985 (С.), 1 самец, 1 самка; Витязь, 15 км южнее Сухановки, 4—20.VIII 1982 (К.), 8 экз.

Живет на покрытых мхом и лишайником ветвях *Quercus dentata*. Характер питания не выяснен. Летит на свет. Личинки (IV—V возраст) с 7.VII до 4. VIII.

Т р и б а Eccritotarsini Р о д Sinevia Kerzhner, gen. n.

Тело сравнительно плоское, овальное, переднеспинка, щиток и надкрылья равномерно покрыты коротким косым опушением.

Голова короткая и широкая. Темя умеренно выпуклое, с невысоким острым килем по заднему краю, приблизительно вдвое шире глаза. Лоб слегка нависает над наличником, впереди округлен. Наличник направлен вершиной косо вниз и назад. Глаза нестебельчатые. Хоботок толстый и короткий, доходит до середины передних тазиков. Усики тонкие, 1-й членик самый короткий, короче ширины темени, 3-й и 4-й членики приблизительно