

Гениталии самца — рис. 29—35.

Длина самца 4,2 мм, самки 4,3, ширина самца 1,85, самки 2 мм.

Прим., Хасанский р-н: Андреевка, бухта Троицы, на свет, 15.VIII 1985 (С.), 1 самец (голотип); Гусевский рудник, 7 км севернее Занадворовки, на свет. 18.VIII 1984 (С.), 1 самка.

Триба *Bryocorini*  
*Bryocoris persimilis* Kerzhner, sp. n.

Очень близок, в том числе по форме парамеров, к *B. pteridis* Fall. (лесная зона от Европы до Камчатки), которого замещает в бассейне Амура. Возможно, является лишь подвидом *B. pteridis*.

Единственное надежное отличие обнаружено, в развитии крыльев: у *B. persimilis* самцы всегда полнокрылые, а самки короткокрылые; у *B. pteridis* самцы и самки короткокрылые, редко полнокрылые. Кроме того, у самцов *B. persimilis* 2-й членник усиков весь черный или светлый не более чем в базальной половине, а вершины передних или всех голеней затемнены, тогда как у самцов *B. pteridis* 2-й членник усиков, как правило, светлый более чем в половине длины, а вершины всех голеней светлые или только у передних затемнены.

Амур.: р. Бурея, 25 км юго-восточнее Райчихинска, 8.VIII 1982 (Зиновьев), 2 самца. Хаб.: Корфовское лесничество, 24.VII 1981 (Кс.), 1 самец. Прим.: заповедник «Кедровая Падь», 22.VIII 1963 (К.), 24 самца (в том числе голотип), 34 самки; там же, 24.VIII 1962 (О. Ковалев), 2 самца; там же, 6.VII 1981 (Кс.), 2 самца; там же, 1.VII—4.IX 1982 (К., Романова), 25 самцов, 29 самок; южнее горы Облачная, 9.VIII 1963 (К.), 1 самец, 5 самок; 40 км восточнее Чугуевки, 25.VIII 1978 (Кс.), 2 самца. Живет на папоротниках под пологом леса.

В Хабаровском и Приморском краях найден также *B. montanus* Kerzh. Он отличается от нового вида формой левого парамера и бурой вершиной задних бедер, а также целиком черной переднеспинкой у большинства самок (у *B. persimilis* задние бедра лишь очень редко у самцов с бледно-бурой полосой на вершине, переднеспинка самок чаще целиком желтая, особи с частично или целиком черной переднеспинкой очень редки).

Подсем. *Deraeocorinae*

Триба *Deraeocorini*

*Deraeocoris (Deraeocoris) josifovi* Kerzhner, sp. n.; рис. 41—45

Очень близок к *D. pallidicornis* Jos., отличается от него более крупными размерами и формой парамеров.

Светло-желтый. Узечки слегка буроватые. 1-й членник усиков в основании с бурым кольцом. Задний край переднеспинки узко-беловатый. Щиток с беловатыми боковыми краями. Жилка, окаймляющая сзади ячейки перепоночки, и край кунеуса от впадения этой жилки до вершины красные. 1-й членник усиков,