

Назван в честь М. Йосифова (София), много сделавшего для познания дальневосточных Miridae.

Подсем. *Mirinae*

Триба *Mirini*

*Polymerus (Polymerus) amurensis* Kerzhner, sp. n.

рис. 46—49

Верх тела матовый или слабоблестящий, голова и переднеспинка не отличаются по блеску от надкрылий. Сверху и снизу тело покрыто прижатыми серебристыми волосками.

Голова черная, у глаз с небольшим желтым пятном. Темя у самца в 1,7, у самки в 1,8—2 раза шире глаза. Усики желтые, 3-й и 4-й членики иногда бурье, длина члеников начиная с 1-го у самца 0,5 мм; 1,8; 0,9; 0,9, у самки 0,47; 1,5; 0,8; 0,8 мм. Хоботок желтый или бурый, доходит до заднего края средних тазиков.

Переднеспинка черная, по всему заднему краю узкожелтая, покрыта густой мелкой пунктировкой, образующей слабые попеченные морщинки. Щиток весь черный, в слабых поперечных морщинках, умеренно выпуклый. Надкрылья черные. Кориум с узкой желтой полоской вдоль основания медиального надлома, желтой приподнятой жилкой во внутреннем углу и желтым или слегка оранжевым пятном вдоль границы с кунеусом. Кунеус по переднему и наружному краям узкожелтый или слегка оранжевый. Жилки перепоночки грязно-желтые. Низ груди черный, тазиковые покрышки и задняя половина испарительной площадки пахучих желез белые. Низ брюшка черный, с желтыми пятнами. Ноги желтые, тазики, частично вертуги, пятно в основании и 2 кольца на вершине бедер (иногда отчасти слитые), кольцо (чаще разомкнутое сверху) близ основания задних голеней, вершина 3-го членика лапок черные. У одной из изученных самок задние бедра сверху по переднему краю с широкой черной полосой, у части особей есть 1—2 бурых кольца или пятна близ основания передних и средних голеней.

Длина 4,3—5,5 мм, ширина 2,1—2,4, ширина переднеспинки 1,7—1,9 мм.

Амур.: Симоново, 75 км западнее Свободного, разнотравно-осоковый луг, 6.VII 1959 (К.), 1 самка. Хаб.: р. Бешеная около Циммермановки, 18.VII 1911 (Солдатов), 1 самка. Прим.: Яковлевка, 26.VI—9.VII 1926 (Дьяконов, Филиппев), 1 самец (8.VII, голотип), 4 самки.

Ближайший к новому виду *P. holosericeus* Hahn из Европы. У него верх тела сильно блестящий (особенно голова и переднеспинка), щеки по наружному краю желтые, щиток сильно выпуклый, кунеус светлый по переднему и заднему краям, но не по наружному краю, бедра черные с 2 светлыми кольцами у вершины, голени с 2, часто разомкнутыми черными кольцами в основании, низ брюшка без светлых пятен.