

четверть перепоночки более темные. На заднем крае задних бедер имеются маленькие бурые пятнышки, вершина их сверху и снизу с 2 бледно-бурыми косыми перевязями, иногда слегка красноватая. Голени с бурыми щетинками и бурыми пятнышками при их основании. 3-й членик лапок в вершинной половине бурый, Низ тела светлый, у самца иногда с боковыми продольными красноватыми полосами на брюшке.

Ширина головы самца и самки 1,14—1,24 мм, ширина темени 0,41—0,46 мм, темя в 1—1,2 раза шире глаза, с килем по заднему краю. Хоботок доходит до средних тазиков. Длина члеников усиков начиная с 1-го 0,66—0,73 мм; 2,00—2,35; 1,14—1,36; 0,64—0,86 мм. Длина переднеспинки 0,96—1,29 мм, ширина 1,94—2,21 мм, отношение ширины к длине 1,67—1,76, редко до 2,03. Задняя доля переднеспинки, клавус и кориум в очень слабой пунктиривке.

Параметры — рис. 63, 64. Спикаула эдеагуса (рис. 69) умеренно изогнута, на вершине не срезана, лопасть эдеагуса сильно расширена к вершине, склеротизована по наружному краю и в области вершинного отростка, который довольно длинный.

Длина 5,5—6,6 мм, ширина 2,3—2,8 мм.

Прим.: Хасанский район: заповедник «Кедровая Падь», 6.VII 1981 (Кс.), 1 самец; там же, 29.VI—5.VII 1982 (К.), 9 самцов (в том числе голотип, 29.VI), 15 самок; Витязь, 15 км южнее Сухановки, 3—7.VIII 1982 (К.), 3 самца, 5 самок.

Живет на ясene носолистном (*Fraxinus rhynchophylla*).

По строению гениталий похож на *L. honshuensis* Lnv., но у последнего спикаула эдеагуса сильно дуговидно изогнута в вершинной части, а вершинный отросток лопасти эдеагуса короткий. Оранжевая окраска нижней части головы позволяет легко отличить большинство особей нового вида и по внешним признакам.

*Lygocoris (Apolygus) nigrovirens* Kerzhner, sp. n.; рис. 70—80

Вид группы *L. spinolae* — *L. lucorum*.

Зеленый. Наличник зачернен в нижней трети или на самой вершине, очень редко весь светлый или черный в нижней трети и с продольной бурой полосой в остальной части наличника, очень редко имеется буроватое пятно на щеках. 3-й и 4-й членики усиков, а иногда и вершина 2-го бурые. Переднеспинка иногда вся светлая, но чаще с 4 или 2 бурыми или черными пятнами у заднего края, а у наиболее темных особей остаются светлыми лишь передняя треть ее и узкое окаймление заднего и боковых краев. Щиток весь светлый или с темными боковыми полосами, у самых темных особей остается лишь светлое пятно на его вершине. Клавус даже у светлых особей обычно с буроватой полоской, у темных же особей весь черный. Кориум с бурым пятном в заднем внутреннем углу, иногда и с другими пятнами, а у самых темных особей остается лишь светлая полоса по