

Сравнительно широкий вид с преобладанием буро-красной или кораллово-красной окраски. Надкрылья в коротком серебристом опушении с добавлением прямых черных волосков.

Голова красновато-черная, редко красно-бурая, шея грязно-желтая. Усики желтые, 1-й членик и вершинная треть 2-го черные, вершинная половина 3-го буроватая. Хоботок желтовато-красный, доходит до середины задних тазиков. Переднеспинка грязно-желтая или красновато-желтая, шейное кольцо и мозолистые возвышения светлые или черные, кроме того, зачернены бока переднеспинки от переднего края до $\frac{4}{5}$ ее длины (рис. 117, 118). Щиток и надкрылья кораллово-красные до темно-красных, кунеус более светлый посередине и с более темной, почти черной вершиной. Перепоночка темно-серая, жилки красные. Низ тела темно-красный до почти черного, тазиковые покрывки и вся площадка пахучих желез белые. Тазики, вертлуги и бедра темно-красные до почти черных. Передние и средние голени желтые, на вершине узкобурые или черные. Задние голени красные. Лапки желтые, 3-й членик на вершине черный.

У самца ширина головы 1,3 мм, ширина темени 0,45, длина члеников усиков начиная с 1-го 1,0; 2,8—2,9; 2,1—2,3; ширина переднеспинки 2,4—2,6, длина задней голени 4,3—5,0 мм.

Длина тела 8,0—8,6 мм, ширина 2,8—3,2 мм.

Прим. заповедник «Кедровая Падь», 3.IX 1964 (Длусский), 3 самца (в том числе голотип); Фроловка, Партизанский р-н, 6.VII 1926 (Ростовых), 1 самец.

К этому виду очень близок (возможно, идентичен с ним) *A. ferrugineus* Hsiao из Китая (провинции Хэбэй и Шаньси). Он отличается иной формой темного рисунка на переднеспинке (в виде широкой поперечной полосы, расширенной по бокам, но не захватывающей мозолистые возвышения). В описании *A. ferrugineus* указаны еще более длинный (заходящий за середину задних тазиков) хоботок и более длинные усики (длина члеников 1,2 мм; 3,0; 2,6; 1,5 мм), но, по сообщению д-ра Чжен Леи (Dr. Zheng Le-yi, Tianjin), у 2 паратипов *A. ferrugineus* хоботок доходит лишь до вершины средних тазиков и длина усиков варьирует (у 2 измеренных самок длина члеников 1,2—1,3 мм; 2,8—3,4; 2,3—2,7; 1,4 мм). Новый вид близок также к *A. triannulatus* Stål, но у последнего переднеспинка окрашена иначе (вся светлая, или вся черная, или с поперечной черной полосой), кунеус с белой поперечной полосой и черной вершиной, а если клавус и кориум красные, то 1-й членик усиков светлый. У *A. piceosetosus* Kulik 1-й и 2-й членики усиков и голова светлые, переднеспинка вся светлая или с поперечной черной полосой.