

возвышения переднеспинки (хотя бы частично) и передние углы щитка светлые, темная полоса на надкрыльях не расширяется сзади. Если у самки надкрылья с темной полосой, то она начинается на уровне вершины щитка и края ее почти параллельные, при этом часть передней доли переднеспинки, боковые углы и вершина щитка светлые. Надкрылья у самца не закрывают вершину генитального сегмента, у самки чаще не доходят до основания последнего сегмента. Парамеры меньше и в значительной части черные (рис. 131, 132) ..... *T. ussuriensis* sp. n.

2(1). Темя в 1,5—1,8 раза шире глаза. У самца с развитым темным рисунком вся переднеспинка и весь щиток черные, а темная полоса на надкрыльях расширяется сзади. Если у самки надкрылья с темной полосой, то она начинается слегка позади щитка и расширяется впереди и сзади, вся переднеспинка (иногда за исключением задних углов) и весь щиток черные. Надкрылья у самца обычно целиком закрывают сверху генитальный сегмент, у самки остается открытой не более половины последнего сегмента. Парамеры крупнее и светлее (рис. 140, 141) ..... *T. antennatus* Boh.

Длина самка 3,4—3,7 мм, самки 4,8—6,0; ширина самца 0,95—1,05, самки 1,5—1,7 мм.

Прим.: ст. Хасан, оз. Дорицени, 25.VIII 1982 (К.), 6 самцов (в том числе голотип), 12 самок; там же, 24.VIII 1963 (К.), 8 самок; оз. Ханка западнее Спасска-Дальнего, 19.VIII 1963 (К.), 6 самок; ст. Уссури, 18.VIII 1926 (Н. Кузнецова), 1 самка.

#### Подсем. *Halticinae*

*Labops nivchorum* Kerzhner, sp. n.; рис. 160—164.

= *setosus* (поп Reuter, 1891); Кулик, 1979; 58, 59, рис. 9, 10.

Самцы полнокрылые. Самки короткокрылые, у них надкрылья сзади косо срезаны и не прикрывают последний сегмент брюшка, по крайней мере его серединную часть, швы между кориумом, клавусом и кунеусом явственные, перепоночкаrudimentарная.

Верх тела в полууприподнятых светлых волосках, длина которых на надкрыльях около 0,15 мм; кроме того, на средней части лба, переднеспинке и щитке имеются легко стирающиеся серебристые чешуйки (сходное опушение имеют *L. setosus* и *L. bami*, но у них волоски на надкрыльях реже, слегка длиннее, до 0,17—0,2 мм, и более торчащие). Волоски на задних голенях светлые, тонкие, легко отличаются от щетинок, на средних и особенно передних голенях отличие менее резкое.

Основная окраска черная. На голове 6 желтых пятен: 2 на темени у глаз, в форме прямого угла; 2 под глазами, у самца обычно очень маленькие; 2 на щеках, последние занимают вершинную половину щек или даже всю их поверхность, а у самки