

(у самца более широко) и на вершине черные или бурые. Лапки черные. Брюшко у самки рыжевато-желтое или желтое по краю.

Глаза направлены в стороны и слегка вверх (направленность вверх выражена лучше у самца и в целом она намного слабее, чем у *L. sahlbergi*, но слегка сильнее, чем у других палеарктических видов). Длина члеников усиков начиная с 1-го у самца 0,55—0,6 мм; 1,6—1,7; 0,8—0,9; 0,8—0,9, у самки 0,5—0,55; 1,3—1,5; 0,75—0,9; 0,8—0,9 мм. Щеки не вздуты. Хоботок доходит до задних тазиков. Переднеспинка в задней половине с хорошо выраженными морщинками.

Левый парамер сравнительно короткий и широкий, с коротким и широким чувствительным бугорком. Правый парамер округлен по всему вершинному краю. Интеррамальный мост копулятивной сумки самки в виде двух отдельных склеритов, как у *L. chelififer* Slat.

Длина самца 4—4,5 мм, самки 3,5—4; ширина самца 1,5—1,6, самки 1,6—1,9 мм; ширина переднеспинки самца 1,1—1,2, самки 1,05—1,2 мм.

Хаб. (низовья Амура): устье р. Табы, оз. Кизи, 3, 7.VIII 1928 (Формозов), 24 самца (в том числе голотип, 3.VIII), 56 самок; северный берег оз. Кизи, 12—13.VIII 1928 (Формозов), 1 самка; остров между Верхнетамбовским и Среднетамбовским, 5.VI 1911 (Солдатов), 1 самка; р. Бешеная около Циммермановки, «Приморская обл.», 4.VII 1911 (Солдатов), 1 самка.

Наиболее близок к *L. chelififer* Slat., описанному [Slater, 1954] по 1 самке из Северной Канады (дельта р. Маккензи), но последний мельче (длина самки 3,14 мм), со светлой вершинной третью щитка и с более широкой светлой полосой по краю надкрылий.

Для различения палеарктических видов рода ниже приведена определительная таблица.

1(2). Глаза высоко приподняты вверх над уровнем средней части темени (рис. 142), сильно стебельчатые. Надкрылья в коротких (не длиннее 0,1 мм) прижатых волосках и по всей поверхности с серебристыми легко стирающимися чешуйками. 4,7—5,5 мм.—Лесная зона Европы и Сибири, на восток до Камчатки и Приморского края. На злаках .....  
.....*L. sahlbergi* Fall.

2(1). Глаза не приподняты или слабо приподняты над уровнем средней части темени (рис. 143), менее стебельчатые. Надкрылья в более длинных (кроме *L. burmeisteri*) полуприподнятых или торчащих волосках, без чешуек или (*L. burmeisteri*) с немногочисленными чешуйками, лишь на границе кориума и клавуса.

3(4). Надкрылья целиком черные, с немногочисленными серебристыми чешуйками (очень легко стираются!), длина волосков