

Ширина головы 0,76—0,80 мм, ширина темени у самца 0,35, у самки 0,37—0,39 мм, темя у самца в 1,50—1,65, у самки в 1,9—2 раза шире глаза. Длина члеников усиков начиная с 1-го 0,23—0,26; 1,15—1,30; 0,65—0,79; 0,40—0,43 мм. Хоботок доходит до средних или задних тазиков. Длина переднеспинки у самца 1,15—1,30 мм, у самки 1,25—1,33, ее ширина у самца 0,57—0,65, у самки 0,65 мм. Длина задней голени 2,0—2,2 мм.

Генитальный сегмент самца снизу с неострым килем в вершинной половине, близ основания с каждой стороны с коротким поперечным валиком. Параметры и эдеагус — рис. 239—244.

Длина самца 3,8—4,3 мм, самки 3,9—4,3; ширина самца 1,6—1,7, самки 1,7—1,8 мм.

Прим.: Горнотаежное, 25 км восточнее Уссурийска, на свет в дендрарии Горнотаежной станции, 30.VI—7.VII 1985 (С.), 13 самцов (в том числе голотип, 1.VII), 9 самок.

Подродовая принадлежность нового вида недостаточно ясна ввиду неопределенности границ между подродами *Phylidea* Reut. (*Hylopsallus* E. Wagn.) и *Psallus* Fieb. Принятое их разделение по окраске бедер не всегда согласуется со строением эдеагуса, весьма разнообразным в каждом подроде, а некоторые виды, сходные по строению эдеагуса, оказываются в разных подродах. Я отнес новый вид условно к подроду *Phylidea*, просто исходя из удобств при составлении определительной таблицы дальневосточных видов.

По светлым усикам, отсутствию 2 темных пятен при основании щетинок на их 1-м членике и светлым ногам сходен (из дальневосточных видов) с *P. cinnabarinus* Kerzh., *P. ulmi* Kerzh. et Jos. и *P. loginovae* sp. н., отличается характерной окраской, постепенно переходящей от желтой к оранжевой или красной, и строением эдеагуса.

*Psallus (Psallus) clarus* Kerzhner, sp. н.; рис. 245—248

Тело у самца в 2,5, у самки в 2,4—2,5 раза длиннее ширины. Голова, переднеспинка, щиток и надкрылья в серебристых почти неуплощенных и в черных или темно-бурых простых волосках.

Голова беловато-желтая, с бледно-бурым рисунком на лбу по бокам от середины и с бурными пятнышками при основании темных волосков на лбу и особенно на темени. Усики светло-желтые, 1-й членик с 2 бурными пятнышками при основании бурых щетинок. Переднеспинка и щиток беловато-желтые, со светлой срединной продольной линией и с многочисленными темно-бурыми пятнышками при основании темных волосков, кроме того, на щитке, а у самца и на переднеспинке имеются немногочисленные и небольшие расплывчатые оранжевые пятна. Кориум и клавус у самца беловатые, с многочисленными расплывчатыми светло-красными пятнами и бурными крапинками при основании части темных волосков, у самки целиком светло-красные, без бурых крапинок, наружный край кориума, жилка R+M и у