

drahamensis, *eurystyloides*, *rufinervis*) к рассматриваемому комплексу не относятся. Ниже дан в алфавитном порядке список палеарктических видов *Pinalitus* (все они ранее включались в *Orthops*): *P. atomarius* (Meyer-Dür, 1843), с о м б. н.; *P. brachycnemis* (Reuter, 1885), с о м б. н.; *P. cervinus* (Herrich-Schäffer, 1841), с о м б. н.; *P. coccineus* (Horváth, 1889), с о м б. н.; *P. conspurcatus* (Reuter, 1875), с о м б. н.; *P. divergens* (Reuter, 1901), с о м б. н.; *P. drahamensis* (Wagner, 1967), с о м б. н.; *P. eurystyloides* (Wagner, 1957), с о м б. н.; *P. festivus* (Kerzhner, 1977), с о м б. н.; *P. flavigenis* (Horváth, 1905), с о м б. н.; *P. insularis* (Reuter, 1895), с о м б. н.; *P. japonicus* (Kerzhner, 1977), с о м б. н.; *P. nigrescens* (Kerzhner, 1977), с о м . н.; *P. oleae* (Wagner, 1967), с о м б. н.; *P. parvulus* (Reuter, 1879), с о м б. н.; *P. rubeolus* (Kulik, 1965), с о м б. н.; *P. rubricatus* (Fallén, 1807); *P. rufinervis* (Reuter, 1879), с о м б. н.; *P. viscicola* (Puton, 1888), с о м б. н.

Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781). Прим.: Горнотаежное (Пуплясис).

* *Adelphocoris rufescens* Hsiao, 1962. Амур.: Климоуцы (Г. Зиновьев), 70 км юго-западнее Шимановска (А. Зиновьев), Игнатьевка в 25 км от Благовещенска (Формозов). Прим.: Черниговка (Емельянов), Новокачалинск (К.). Изучен также материал по этому виду из Китая и с п-ова Корея (Хесандин, Херин, Пукхён).

* *A. ponghuariensis* Josifov, 1978. Прим.: Горнотаежное (С.), ст. Ручьи и Фроловка Партизанского р-на (Ростовых), Новокачалинск (К.), Витязь (К.), Рязановка (Пуплясис).

Phytocoris pallidicollis Kerzhner, 1977. Прим.: Горнотаежное (К.), заповедник «Кедровая Падь» (К.), Витязь (К.), Андреевка (С.).

Ph. insignis Reuter, 1876. Прим.: Заповедный (К.), побережье напротив о-ва Петрова (Ануфриев).

Teratocoris paludum J. Sahlberg, 1870. Маг.: хр. Большой Анначаг близ Тыэллах (Б.). Амур.: Симоново (К.). Прим.: оз. Ханка (К.), Хасан (К.).

T. viridis Douglas et Scott, 1867. Чукотка: устья Чауны и Пучевея (Рябухин).

Actitocoris signatus Reuter, 1878. Маг.: хр. Большой Анначаг (Б.).

Labops burmeisteri Stål, 1858=*L. nigripes* Reuter, 1901, с у п. н. *L. burmeisteri* описан с Камчатки (в более поздних сборах оттуда отсутствует), а *L. nigripes*, отличающийся целиком черными голеньями,— с верховьев р. Иркут. Анализ больших материалов показал, что в популяциях, распространенных к востоку от низовьев Енисея и Читы, голени всегда желтые, зачерненные только в основании и на вершине, а в популяциях из более западных районов они не всегда целиком черные, а бывают отчасти желтыми или красноватыми (особенно