

задние), явно промежуточный характер окраски у популяций из Хэнтэя.

Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1855). Амур.: Климоуцы (Г. Зиновьев), Симоново (К.).

* *Campylotropis jakovlevi* Reuter, 1904. Прим.: Уссурийск (Шаблиновский), Горнотаежное (С.).

Ulmocyllus virens Seidenstücker, 1964 = *Cyllecoris ulmi* Kulik, 1965, s u. p. Изучен голотип *C. ulmi*.

* *Cyllecoris nakanishii* Miyamoto, 1969. Прим.: Горнотаежное (С., Пуплясис), Витязь (К.). К виду относятся все указания *C. equestris* Stål с Сахалина и Кунашира [Кержнер, 1978].

Globiceps salicicola Reuter, 1880. К этому виду относятся указания *G. fulvicollis* Jak. из Маг. [Матис и др., 1977] и Якутии [Винокуров, 1979]³. Он найден также в Хаб.: оз. Кизи (Формозов). Указания *G. fulvicollis* (как *G. cruciatus* Reut.) из южных районов Восточной Сибири [Кулик, 1965; и др.] относятся к *G. flavomaculatus* De Geer.

Orthotylus (Orthotylus) nassatus (Fabricius, 1787). Прим.: Фроловка (Ануфриев), Витязь (К.).

O. (Melanotrichus) parvulus Reuter, 1879 = *O. (M.) pamphoenensis* Josifov, 1976, s u. p. Прим.: ст. Провалово близ устья Раздольной, на Salicornia europaea (К.). Изучены топотипы *O. parvulus* и паратипы *O. pamphoenensis*.

O. (Labopidea) algens Vinokurov, 1982. Маг.: Сусуман (Б.).

O. (L.) artemisiae J. Sahlberg, 1878. Восточная граница ареала нуждается в уточнении, проверенные материалы в коллекции ЗИН АН СССР собраны от Полярного Урала до устья Яны. Указание Винокурова [1979] для устья Колымы (Походск) относится к *O. discolor* J. Sahlb. Указание Кириченко [1960] для Чукотки не согласуется с имеющимся в коллекции (возможно, уже неполным) материалом: в тексте статьи по сборам Г. Семенова с р. Ичуны указаны *Orthotylus* sp. (VI. 1940) и *O. artemisiae* (2. IX 1939 и 28. VII 1940), в таблице для Чукотки показаны *O. discolor* и *O. artemisiae*, в коллекции имеются из упомянутых сборов *O. lenensis* Lindb. (19. VI 1940) и *O. discolor* (3. VII 1940).

O. (L.) lenensis Lindberg, 1928 = *Labopidea idahoensis* Knight, 1968, s u. p. Чукотка: р. Ичуны (Семенов). При установлении синонимии сравнены большие материалы из СССР с 1 самцом и с 1 самкой из США, полученными от Хенри (Th. J. Hennig); им также предполагалась эта синонимия (сообщение в письме).

* *Pilophorus miyamotoi* Linnauhogi, 1961. Прим.: Витязь, на *Pinus densiflora* (К.). Типы этого и всех других упомянутых ниже видов, установленных Р. Линнавуори и Б. Поппигусом, были мною изучены.

* *P. lucidus* Linnauhogi, 1962. Прим.: Уссурийск (Шаблиновский), Виноградовка (Кириченко).

³ Н. Н. Винокуров [1985] неверно отнес эту находку к *G. flavomaculatus*.