

14. *Psallus* (s. str.) *falleni* Reut. (рис. 38, 39).

♂. Тело ярко-красного, розового или красновато-коричневого цвета, покрыто золотистыми чешуйками и густыми светлыми и черными волосками. Голова желтая, с красноватыми пятнами. Темя в 3 раза уже ширины головы. Усики светло-желтые.

1-й членик усиков с двумя черными точками, 2-й членик усиков длиннее 3-го и 4-го, вместе взятых. Переднеспинка желтая, с неясными коричневыми и красными пятнами. Надкрылья желтые или красноватые. Перепоночка темная, с неясными светлыми пятнами. Ноги желтые. Бедра покрыты темными точками, которые на вершине бедер становятся гуще. Вершина эдеагуса несет продольный ряд зубчиков; предвершинный отросток довольно длинный и значительно выступает за наружный край вершины эдеагуса.

♀. Походит на самца, отличается лишь более широким теменем.

Длина тела 3.6—4.3 мм.

Материал: Северный Кавказ — 6 ♂♂ и 8 ♀♀, Салги, Чечено-Ингушская АССР, 4 VIII, 5 VIII (Кириченко); Гузерипль, субальп. луг, 19 VI 1935 (Чистовский); Грузия — 1 ♀, оз. Рица, Абхазия, 22 VII 1958 (Жильцова).




Рис. 36—37. Вершина эдеагуса *Psallus lepidae* Fieb.

Общее распространение: лесная зона европейской части СССР, Кавказ, Европа.

На лиственных деревьях, чаще на березе. Имаго VII—IX. Зимуют яйца.

15. *Psallus* (s. str.) *minusculus* I. Zaitzeva, sp. n. (рис. 40, 41).

Вид по строению эдеагуса стоит ближе всего к *P. falleni* Reut.; отличается от него более коротким предвершинным отростком и наличием чет-




Рис. 38—41. Вершина эдеагуса..

38, 39 — *Psallus falleni* Reut.; 40, 41 — *P. minusculus* I. Zaitzeva, sp. n.

кого второго ряда зубчиков на вершине эдеагуса. Для вида характерны следующие признаки, отличающие его от *P. falleni*.

Переднеспинка и щиток темно-бурые. Затылок шире, отношение ширины головы к ширине темени равно 2 : 1 (у ♂ *P. falleni* отношение ширины головы к ширине темени равно 3 : 1); бедра более темные, коричневатого