

Pronotum brun cannelle, avec une tache brun sombre s'étendant en demi-cercle sur la partie postérieure du disque — ou en bande large longitudinale sur tout le pronotum (chez le cotype).

Ecusson brun sombre; hémélytres jaunâtres avec le clavus et l'angle interne de la corie brun sombre, ainsi qu'une fine ligne sur le bord externe de la corie et du cuneus; membrane enfumée.

Pattes jaunâtres clair.

Abdomen brun sombre, avec une tache jaunâtre de chaque côté des segments. Pilosité courte et argentée sur la face, le pronotum et la corie.

Longueur : 4,8 mm.




Fig. 1. *Prodomus nimbus*, n. sp. — Fig. 2. *Seversyia lupa*, n. sp.

Type : 1 ♂ et cotype: 1 ♂ : IFAN 1946. Mt Nimba N.-E., 500-700 m. A. VILLIERS. Forêt primaire 1.20.IX. (Coll. IFAN et ma coll.)

Le disque du pronotum fortement et régulièrement voûté, la pigmentation à base de brun, les téguments plus durs, différencient nettement cette espèce de celles déjà connues ou décrite ci-dessus.

2. MACROLOPHINAE.

Seversyia, nov. gen. (1)

Tête pourvue d'une corne atteignant le quart basal du premier article antennaire. Yeux gros, saillants, espace interoculaire plus étroit que la largeur de

(1) Anagramme : ce genre est affectueusement dédié au P^r VAYSSIÈRE.