

der Färbung den Vertretern der Untergattung *Lophyromiris* WGN. Letztere Arten haben aber 3 gelbe Längsflecken auf dem Pronotum, der Kopf ist zweifarbig, die Tibialdornen entspringen nicht aus dunklen Höfen und der Aedeagus ist anders gebaut. *L. decoratus* (REUT.) unterscheidet sich auch von allen *Adelphocoris*-Arten durch das Fehlen von aufgerichteten Borsten am 1. Fühlerglied, breiteren Kragen, andere Form der Zügel und durch den Bau des Aedeagus (vergleiche Abb. 43).

*Lovistes decoratus* (REUTER), comb. n.

W: 20 km nordöstl. Čhôngđin, 5. VI. 1965, 1 ♂. L: Jalu (K), 1 ♀.

### *Adelphocoris* REUTER

*Adelphocoris* REUTER, 1896, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh., 38: 168 (Typus-Art: *Cimex seticornis* FABRICIUS, 1775).

*Trichophoroncus* REUTER, 1896, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh., 38: 168 (Typus-Art: *Calocoris albonotatus* JAKOVLEFF, 1881), syn. n.

*Fulgentius* DISTANT, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., 13 (7): 103 (Typus-Art: *Fulgentius mandarinus* DISTANT, 1904 = *Calocoris albonotatus* JAKOVLEFF, 1881), syn. n.

Die Genitalien des ♂ zeigen beim *Trichophoroncus albonotatus* (JAK.) keine nennenswerten Unterschiede im Vergleich zu diesen der *Adelphocoris*-Arten. Das Genitalsegment (Abb. 40) ist an der linken Seite mit einem größeren, an der rechten Seite mit einem kleineren spitzen Zähnchen. Die Parameren sind wie bei den *Adelphocoris*-Arten (Abb. 41 und 42). Der Aedeagus (Abb. 43) ist mit einem kammartigen Anhang und mit einer gekrümmten Spicula. Die von REUTER gegebenen äußeren Merkmale („Pronotum latitudine basalis parum brevius, postice fortiter convexum, callis obsolete, structura apicali setis rigidis erectis. Scutellum convexum“) sind auch nicht ausreichend für die Trennung der Art in eine selbständige Gattung. Bei vielen *Adelphocoris*-Arten trägt der Kragen auch aufgerichtete Haare, das Pronotum ist schmal und hinten ein wenig gewölbt, das Scutellum ist auch gewölbt, wie zum Beispiel bei *Adelphocoris obliquefasciatus* LINDB., der im Fernem Osten der UdSSR auf einer *Vicia*-Art vorkommt.

*Adelphocoris albonotatus* (JAK.), comb. n.

• W: Dephun bei Kujang-dong, 4. IX. 1959, 1 ♂; Kreis Hjangsan, Tal d. Fl. Hjangsan-čhon, 18. VI. 1965, 1 ♂, L: Wönsan, 6.-24. VI. (S); Pal'mak, 29. VI. (S); zwischen Tegu und Jumokči-šumegi, 16. IX. (S); Pukčhông (B). Insgesamt 9 ♂♀.

### *Adelphocoris triannulatus* (STÅL)

*Deraeocoris triannulatus* STÅL, 1858, Stett. ent. Zeitg., 19: 183.

*Calocoris nigriceps* SAHLBERG, 1878, K. Svensk. Vet. Ak. Handl., 16 (4): 25.

*Calocoris insularis* HORVÁTH, 1879, Term. Füzetek, 3: 147.