

Fig. 3. *Radama inflatus* R.

4. — Antenne.
5. — *spinipennis* R.
6. — M  tasternum, abdomen pattes intermediaires et post  ri  res du ♂.
7. *Desimia (Tetracis) Sharpi* R.
8. — Palpe maxillaire.
9. *Tmesiphorus umbrosus* R. — Palpe maxillaire.
10. *Pselaphus sulcifrons* R.
12. *Acylopselaphus Mariee* R. Palpe maxillaire.
13. — Derniers articles de l'antenne.
14. — Tarse.
15. *Schaufussia brevis* Schfs. Palpe maxillaire.
23. *Schistodactylus phantasma* R. Tarse, vu de dessus.

PLANCHE V.

Fig. 11. *Acylopselaphus Mariee* Raffr.

17. *Tyromorphus nitidus* R.
18. — Palpe maxillaire.
19. *Filiger vestitus* R.
20. *Schistodactylus phantasma* R.
21. — Palpe maxillaire.
22. — Tarse, vu de c  t  .
24. *Zethopsis (Zethus) Dohrni* R.
25. — Palpe maxillaire.
26. *Autoplectus torticornis* R.
27. — Tarse.
28. — Palpe maxillaire.
29. — Antenne.

TROIS NOUVELLES ESP  CES DE *CAPSIDES* DE FRANCE

Par le Dr O. M. REUTER (1).

1. *Campylomma Nicolasi* Put. et Reut.

Pallide straminea, superne sordide flavidо albicans, pronoto antice leviter virescente, longius nigro-pubescent et inter pilas nigras subtiliter flavo-pubescent; capite, margine tenui verticis excepto, pronoto postice obsolete scutelloque basi aurantiacis; clypeo concolor vel ipso apice nigro-fusco; antennis articulo primo annulo anteapicali externe interrupto articuloque secundo annulo basali angusto nigris; hemelytris unicoloribus subpellucentibus; femo-

(1) Les types se trouvent dans la collection de M. le Dr A. Puton.

ribus punctis nigris, tibiis spinulis nigris e punctis nigris nascentibus. — Long., ♂ ♀ 2 4/5 mill.

Patria : Gallia meridionalis (Avignon!).

C. verbasci H. Sch. similis, sed multo pallidior, hemelytris unicoloribus, articulo primo antennarum annulo anteapicali externe interrupto, clypeo concolore vel solum ipso apice fuso distinguendus. Corpus inferne pallide stramineum vel ad partem fuscescens, subtiliter pallido-pubescent, superne pallidissime flavidio-albicans, pilis nigris longioribus aliisque subtilibus flavis vel pallide aureis pubescent. Caput aurantiacum, margine tenui verticis albicante, clypeo concolore vel ipso apice nigro-fusco; vertice oculo vix circiter 2/3 latiore. Oculi nigro-fusci. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, pallide flavens, apice piceo-nigro. Antennae stramineo-albidæ, articulo primo annulo anteapicali externe interrupto, secundo ad basin annulo angusto nigris. Pronotum dilutissime flavidio-albicans, antice in albido-virentem levissime vergens, angulis posticis in aurantiacum leviter vergentibus. Scutellum albicans, basi aurantiacum. Hemelytra sordide pallidissime flavidio-albicantia, unicolora vel cuneo obsoletissime obscuriore, subsemipelluentia, membrana sat dilute fumata, venis albidis. Pectus et abdomen pallide straminea vel (interdum ♂) fuscescentia, segmento genitali tamen albido, lateribus et superne ochraceo vel aurantiaco. Pedes cum coxis totis albicantes, femoribus anterioribus subtus ad marginem inferiorem punctis 5-6 et puncto subapicali marginis superioris nigris, posticis margine inferiore punctis 4, duobus apicalibus minoribus, puncto majore discoidali paullo ante apicem, margine superiore punctis circiter 7, anteapicali magno, geminato, pilifero; tibiis spinulis nigris e punctis nigris versus basin tibiarum magnis nascentibus, tibiis anticis dimidio apicali inpunctatis.

2. *Platycranus metriorrhynchus* Reut.

Prasinus, opaculus, longe niveo vel subargenteo-tomentosus, tomento faciliter divellendo; capite (♀) basi pronoti latitudine æquali, vertice, vittis duabus frontis divergentibus, callis pronoti, basi detecta scutelli, venis membranæ antennisque ochraceis, his articulo primo prasino parte capitis anteoculari a latere viso haud longiore, subtiliter niveo-pubescente; rostro apicem coxarum intermedianarum attingente, dimidio apicali testaceo, apice piceo; pronoto basi longitudine duplo latiore; pedibus modice longis. — Long., ♀ 4 1/2 mill.

* Patria : Gallia (Apt !), a Dom. Abeille de Perrin lecta.

A. *Pl. Erberi* Fieb. et *Putoni* Reut. corpore minore, minus elongato, rostro longiore, articulo antennarum primo breviore, pronoto breviore et magis transverso, cuneo minus elongato pedibusque mediocribus bene distinctus. Corpus prasinum, opaculum. Caput a tergo visum pronoto paullo longius, cum oculis basi pronoti latitudine aequale, prasinum, precipue antice longe et dense niveo vel fere argenteo-tomentosum, vertice vittisque duabus minus distinctis frontis ochraceis, illo oculo fere triplo latiore (♀). Oculi virescentes, feminæ alte positi. Rostrum basin versus virescens, apicem versus testaceum, apice piceo, apicem coxarum intermediarum attingens, articulo primo caput subsuperante. Antennæ (♀) paullo infra apicem oculorum insertæ, ochraceæ, articulo primo parte anteoculari capitis a latere viso longitudine aequali, virescente, subtiliter niveo-pubescente, secundo linearí latitudine pronoti apicali circiter duplo longiore. Pronotum horizontale, basi longitudine duplo latius, lateribus levissime sinuatis, apice (♀) longitudine saltem 2/5 latiore; prasinum, pilis niveis hic illuc instructum, callis optime elevatis dilute ochraceis. Scutellum prasinum, pilis niveis longis hic illuc tomentosum, parte basali detecta ochracea. Hemielytra prasina, pilis niveis hic illuc tomentosa, margine pallido-pubescentia, latitudine communi circiter triplo longiora, cuneo latitudine basali duplo longiore, margine externo nonnihil in ochraceum vergente; membrana dilute grisea, iridescente, areolis maculaque parva ad apicem cunei hyalinis, venis ochraceis. Corpus inferne prasinum, pectore niveo-tomentoso, mesosterno longe niveo-piloso, ventre longe albido-pubescente. Pedes prasini, coxis basi macula ochracea, tibialis apice tarsisque testaceis, his apice unguiculisque fuscis.

3. *Orthotylus cupressi* Reut.

Virescens, superne longe et dense flavo-pubescent, pronoto fere flavo-piloso, pilis nigris totus destitutus; vertice (♀) subtiliter marginato; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis articulo primo capite duplo breviore, secundo latitudine basali pronoti longitudine subæquali, duobus ultimis simul sumtis secundo brevioribus, tertio secundo circiter 1/3-2/5 breviore; hemielytris viridibus, haud diaphanis, membrana dilute grisea, venis dilute et sordide flavo-virentibus, areolis nitidulis, levibus, dilute flavo-virentibus, semi-pelluentibus; tibiis spinulis subtilibus pallide testaceis. — Long., ♂♀ 3 1/3-3 1/2 mill.

Patria: Gallia meridionalis (Avignon!), communicavit D. Dr Puton.
Habitat in *Cupresso pyramidali*.

Species parvula a reliquis affinibus corpore breviore et latiore hemielytrisque haud pelluentibus mox distinguenda. Corpus oblon-

gum vel oblongo-ovale (♀), superne longe et densius flavo-pubes-
cens, pilis nigris nullis. Caput (♀, marem solum unicum nimis mu-
tilatum vidi) pronoti basi circiter duplo angustius, vertice subtiliter
marginato, margine acutiusculo oculo circiter 1/3 latiore, fronte con-
vexiuscula, clypeo basi supra lineam inter scrobes antennarum duc-
tam et fere in linea oculorum intermedia posito. Oculi virescentes. Ros-
trum apicem coxarum posticarum attingens, apice nigro. Antennæ
colore corporis, subtiliter pubescentes, articulo primo (♀) capite duplo
breviore, secundo primo fere quadruplo longiore, duobus ultimis con-
junctim secundo brevioribus. Pronotum basi longitudine magis
quam duplo latius. Scutellum saepe flavescens. Hemelytra vires-
centia, haud diaphana, membrana levissime fumata, macula ad
apicem cunei hyalina, venis dilute flavo-virentibus, areolis venis
concoloribus lœvibus nitidis semipelluentibus. Pedes colore corporis,
tibiis spinulis gracilibus sat longis pallido-testaceis, tarsis apice
fuscouscentibus. Segmentum maris genitale magnum, forcipibus
magnis, dextra margine interiore quam exteriore longiore, leviter
arcuata, margine supero oblique sinuata, angulo apicali interiore
breviter obtuse producta, exteriore in apiculum fere transversalem
prolongata.

SUR QUELQUES TENTHREDINES

Par le Dr A. PUTON.

Dans le n° 15 du *Bulletin de la Soc. Ent. de France*, M. André
signale comme nouvelle pour la France l'*Eriocampa soror* Vollenh.,
qui dévaste ses rosiers. J'ai déjà signalé cette Tenthredine comme
française dans le n° 1 (1883) de la *Revue*; toutefois ma note n'a pas
pour but de revendiquer la priorité de cette découverte désagréable;
je tiens seulement à observer que, l'an dernier, la même espèce avait
causé les mêmes ravages à un rosier de mon jardin et que, cette
année, le même rosier a été dévasté, mais par une autre espèce, la
Blennocampa pusilla Kl. — J'ai aussi observé sur d'autres rosiers
d'autres larves très-nOMBREUSES qui appartiennent certainement à
une Tenthredine (*Emphytus?*), mais que je n'ai pu éléver pour
cause de voyage. Cette année, si pauvre en insectes parfaits, a été
d'ailleurs remarquable par l'abondance des larves des Tenthredines
qui, dans mon jardin, ont ravagé les *Lysimachia vulgaris* (*Eriocampa luteola*),
Convallaria multiflora (*Blennocampa aterrima*),
les groseillers (*Nematus?*), *Spiraea aruncus* (*Blennocampa?*), etc.
