

Habitus. – Corps noir mat. Pubescence dense et noire. Longueur du ♂ : 4 mm et de la ♀ : 4,1 mm.

Tête. – Noire avec soit une tache triangulaire allongée claire à coté de l'œil ou bien une bande claire occupant tout le vertex. Mensurations en mm : ♂ : médiane : 0,70 ; diatone : 0,60 ; synthlipsis : 0,25 ; ♀ : médiane : 0,62 ; diatone : 0,65 ; synthlipsis : 0,33. *Antennes* : Longueur des articles, en mm : I : 0,4 ; II : 1 ; III : 0,65 ; IV : 0,35. Le second article chez les deux sexes avec un épaississement à peine sensible sur les 2/3 distaux. Cette partie porte une forte pilosité et de ce fait semble mat (fig. 35). *Rostre* atteignant ou dépassant légèrement les hanches postérieures.

Thorax noir. Hémélytres noirs excepté une bande blanche à la base du cuneus ; membrane avec une tache blanche en arrière des cellules dont la nervure transverse est également blanche. Pattes (comme les antennes) entièrement noires.

Génitalia ♂ (fig. 2, 8 à 27) et ♀ (fig. 3, 28 à 34).

Derivatio nominis. – Je dédie cette espèce en hommage amical à mon ami Bernard Ehanno de Rennes spécialiste des Miridae, admirateur de l'oeuvre de E. Wagner dans la collection duquel j'ai découvert ce *Macrotylus*.

Observations : Les spécimens sont répertoriés dans la faune méditerranéenne de WAGNER, (1973), mais cet auteur avait identifié l'espèce sous le nom *Macrotylus soosi* Josifov. Le dessin qu'il donne du pénis (fasc. 39 p. 379, fig. 608 c) est fort ressemblant à celui que j'ai pu exécuter en utilisant la vesica provenant de sa dissection, mais très éloigné de la figure que JOSIFOV (1962) donne pour *M. soosi*. Il est dommage que je n'aie pas trouvé le segment génital mâle sur la paillette portant cette dissection.

Grâce au restant de la série préservé dans les collections Eckerlein, au Muséum de Genève, et Linnavuori, Raisio, j'ai pu, en disséquant trois mâles, observer ce segment génital (fig. 6). J'ai également disséqué une femelle de la série du Muséum de Genève.

En conséquence la correction suivante s'impose dans la publication de RIBES & GOULA, 1986 : p. 276 ; remplacer "n° 825 *soosi* Jos., 1962 (2)", par "n° 825 *ehannoi* Matocq, 1995 (2 ; 1 hol., 1 parat.)".

Clés de détermination des *Macrotylus de couleur noire*

Les clés proposées ont été établies après l'observation et la dissection des espèces suivantes :

Macrotylus (Macrotylus) quadrilineatus (Schrank, 1785) : spécimens ♂ et ♀ de la collection générale du MNHN, Paris.

M. (M.) lindbergi E. Wagner, 1953 : 3 paratypes, soit 2♂, 1♀ de la collection E. Wagner, Hambourg.

M. (M.) seidenstueckeri E. Wagner, 1954 : 2 paratypes, soit 1♂, 1♀, plus 4 spécimens, soit 2♂, 2♀ de la collection G. Seidenstücker, Munich ; plus 1♂ de la collection R. Linnavuori, Raisio.

M. (M.) soosi Josifov 1962 : holotype, ♂, et 2 paratypes, dont 1♀, du Musée hongrois d'Histoire naturelle à Budapest ; 1 paratype ♀ de la collection M. Josifov, Sofia ; plus 4 spécimens, soit 2♂, 2♀ de la collection E. Heiss, Innsbruck et 1♀ de la collection R. Linnavuori, Raisio.

M. (M.) scutellaris E. Wagner, 1966 : holotype ♂ et 2 paratypes, soit 1♂, 1♀ de la collection E. Wagner, Hambourg et 1♂, 1♀ de la collection R. Linnavuori, Raisio.

M. (M.) phlomidis Rieger, 1984 : 2 paratypes, soit 1♂, ♀ de la collection Rieger, Nürtingen.

M. (M.) bernadettæ Matocq, 1995 : paratypes ♂ et ♀ des collections Magnien, Matocq et Péricart.

M. (M.) ehannoi n. sp. : 15 ex. ; soit 1♂, 1♀ de la collection E. Wagner, Hambourg, plus 6♂, 5♀ de la collection Eckerlein, Geneve ; et 1♂, 1♀ de la collection R. Linnavuori, Raisio.

Note : L'espèce *Macrotylus (Pontodemus) ponticus* Seidenstücker, 1967, n'est pas considérée ici. Pour son identification je renvoie le lecteur à la publication originale de cet auteur.

→

Fig. 1 à 17. – 1-3, *Macrotylus (Macrotylus) quadrilineatus* (Schrank, 1785) : – 1, segment génital ♂ ; – 2, extrémité du pénis ; – 3, anneaux sclérifiés de la ♀ ; (2 & 3, d'après SEIDENSTÜCKER, 1967). – 4-7, segments génitaux ♂ : – 4, *M. lindbergi* ; – 5, *M. seidenstueckeri* ; – 6, *M. ehannoi* n. sp. ; – 7, *M. bernadettæ* ; (4, 5, d'après Wagner, 1970). – 8 à 17, pénis de *Macrotylus* et son extrémité grossie vu sous divers aspects : – 8, 9, *M. lindbergi* ; – 10-12, *M. bernadettæ* ; – 13, 14 à 17, *M. ehannoi* n. sp.