

Правый парамер с хорошо заметным выступом на наружном крае у основания ложки; левый — с развитым выступом по наружному краю.

Длина тела: ♂ 2.5—3 мм, ♀ 3.5—4 мм.

Близок *M. nigripes* Reut. Отличается окраской надкрылий, строением лба и 1-го членика усиков у ♂, размерами тела и формой гениталий ♂.

Голотип — ♂, паратипы — 10 ♂♂, 15 ♀♀ (ЗИН): ур. Хан-Тахта, Гиссарский хр., 10 VII 1933 (Вельтицев).

18. *M. nigripes* Reut. (рис. 5, 45, 46, 89, 90).

Reuter, 1879 : 172 (*Diplacus*); 1891 : 108, 172; Horváth, 1926 : 192; Кириченко, 1952 : рис. 6; 1964 : 226 (также как *M. occultus*, nom. nud.).

От других видов резко отличается строением усиков ♂ и выступающим лбом. Гениталии отличные от таковых у других видов.

Лектотип — ♂, паралектотипы 2 ♂♂ и 2 ♀♀ (ЗИН) и 1 ♂ (МХ): пер. Ягноб, Гиссарский хр.

Распространение. Гиссарский хр. Изучено свыше 400 экз. Обитает на высоте 2000—3300 м.

ВЫВОДЫ

На основе изучения коллекционных материалов, а также сборов в 36 пунктах Тянь-Шаня и Алая для этого района установлено 18 видов рода *Myrmecorhyses*, которые относятся к номинативному подроду и разделяются на 6 самостоятельных групп, отличающихся морфологически и экологически.

ЛИТЕРАТУРА

- Быков А. А. 1969. Новые виды слепняков из Киргизии. Изв. АН КиргССР, 1 : 54—55.
- Быков А. А. 1970. Новый вид клопа *Myrmecorhyses piceus* Вуков, sp. n. (Hemiptera, Miridae), из Киргизии. В сб.: Энтомологические исследования в Киргизии, «Илим» : 54—55.
- Кержнер И. М. 1964. Новые и малоизвестные полужесткокрылые (Heteroptera) из Казахстана и других районов СССР. Тр. Зоолог. инст. АН СССР, 34 : 113—130.
- Кержнер И. М. 1970. Новые и малоизвестные слепняки (Heteroptera, Miridae) из СССР и Монголии. Энт. обзор., 49, 3 : 634—645.
- Кириченко А. Н. 1931. Настоящие полужесткокрылые. Труды Памирской экспедиции 1928 г., М., 8 : 77—118.
- Кириченко А. Н. 1952. Настоящие полужесткокрылые и цикадовые. В сб.: Ущелье Кондара, М.—Л. : 181—197.
- Кириченко А. Н. 1964. Полужесткокрылые Hemiptera (Heteroptera). Таджикистана. Душанбе : 1—258.
- Пучков В. Г. 1967. К экологии малоизвестных видов полужесткокрылых (Heteroptera) европейской части СССР. Сообщ. III. Вестник зоологии, Киев, 5 : 64—69.
- Horváth G. 1926. Species Miridarum generis Myrmecorhyses Fieb. Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung., 23 : 187—197.
- Reuter O. M. 1879. Till kändedomen om mimiska Hemiptera och deras lefnads historia. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh., 27 : 141—198.
- Reuter O. M. 1890. Annotationes Hemipterologicae. Rev. d'Ent., Caën, 9 : 248—254.
- Reuter O. M. 1891. Hemiptera Gymnocerata Europae, IV, Helsingfors (Acta Soc. Sci. Fenn., 23, 1) : 1—179.
- Reuter O. M. 1894. Ad cognitionem Capsidarum, II. Capsidae palaearticae. Rev. d'Ent., 13 : 128—154.
- Reuter O. M. 1901. Capsidae rossicae. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh., XLIII : 161—194.
- Reuter O. M. 1903. Capsidae novae rossicae. II. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh., XLVI, 4 : 1—17.

Институт биологии
АН КиргССР,
г. Фрунзе.