

- vanduzeei* Reuter Jamaica
 1907 *Pycnoderes vanduzeei* Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 49(5):1 (n. sp.)
 1907 ————— Van Duzee, Bul. Buf. Soc. Nat. Sci. 8(5):32 (note)
- venustus* Stål Brazil
 1860 *Eccritotarsus venustus* Stål, K. Sv. Vet. Akad. Handl. 2(7):58 (n. sp.)
 1873 ————— Walker, Cat. Het. 6:168 (list)
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 53(2):43 (cat.)
 1922 *Neofurius venustus* Bergroth, Ark. f. Zool. 14(22):17 (note)
 1941 *Pycnoderes venustus* Carvalho & China, Ann. Mag. Nat. Hist. (12)4:676 (n. comb.)
- Genus SINERVUS Stål
- Type *Sinervus baerensprungi* Stål, 1860 (monobasic)
- SINERVUS 1860 Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):56 (n. gen.)
 ——— 1873 Walker, Cat. Het. 6:168 (list)
 ——— 1890 Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 58(2):50 (cat.)
 ——— 1906 Kirkaldy, Trans. Amer. Ent. Soc. 32:134 (cat.)
 ——— 1910 Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 37(3):153 (cat.)
 ——— 1945 Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:35 (descr., key spp.)
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (cat.)
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):31 (key)
- **PRODROMOPSIS** 1911 Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(2):4 (n. gen.) — type:
cuneatus (Distant, 1909) (monobasic) — (syn. by Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191, 1948)
- baerensprungi* Stål Brazil
M. Gerais
 1860 *Sinervus baerensprungi* Stål, K. Sv. Akad. Handl. 2(7):56 (n. sp.)
 1873 ————— *Baerensprungi* Walker, Cat. Het. 6:168 (list)
 1890 ————— *baerensprungi* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal. 58(2):50 (cat.)
 1922 ————— Bergroth, Ark. Zool. 14(22):14 (list)
 1945 ————— Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:36, figs. 52-55
 (redescr., key)
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):57 (as type)
- basalis* Poppius Formosa
 1915 *Prodromopsis basalis* Poppius, Arch. Naturg. 80A(8):56 (n. sp.)
 1948 *Sinervus basalis* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)
- costalimai* Carvalho Brazil
M. Gerais
E. do Rio
Rio de Janeiro
Ceylon
 1945 *Sinervus costalimai* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:39, figs. 61-64 (n. sp.)
- cuneatus* Distant
 1909 *Prodromus cuneatus* Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. 4:453 (n. sp.)
 1910 ————— Distant, Faun. Brit. Ind. Rryn. 5:246, fig. 134 (descr.)
 1911 *Prodromopsis cuneatus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 53A(2):4 (mention)
 1948 *Sinervus cuneatus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)
- discopiceus* Carvalho Brazil
M. Grosso
 1945 *Sinervus discopiceus* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:37, fig. 56 (n. sp., key)
- hyalipedes* Carvalho Brazil
M. Gerais
Rio de Janeiro
 1945 *Sinervus hyalipedes* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 36:38, figs. 57-60 (n. sp., key)
- oculatus* Poppius New Guinea
 1911 *Prodromopsis oculatus* Poppius, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 54A(30):10 (n. sp.)
 1948 *Sinervus oculatus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)
- philippinensis* Poppius Luzon
 1915 *Prodromopsis philippinensis* Poppius, Phil. Jour. Sci. 10:83 (n. sp.)
 1948 *Sinervus philippinensis* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)
- scutellaris* Poppius Java
 1914 *Prodromopsis scutellaris* Poppius, Tydschr. Ent. Suppl. 56:159 (n. sp.)
 1948 *Sinervus scutellaris* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 8(2):191 (n. comb.)