

- 1909 *Paracalocoris scrupeus* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 36(2):39 (note) N. J.
 1910 ————— Smith, Cat. Ins. N.J. ed. 3:163 (list) N. Y.
 1915 ————— Fcft, Albany St. Mus. Bul. 175:41 (pest of grape) Neb.
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:326 (cat.) Ont.
 1917 ————— McAtee, Ann. Ent. Soc. Amer. 9:368 (1916) (descr.) Pa.
 (with 15 new varieties as follows: *rubidus*, *percursus*, *triops*, *diops*, *delta*,
compar, *ardens*, *cunealis*, *lucidus*, *sordidus*, *bidens*, *bicolor*, *varius*, *nubilus*,
scrupeus, *par*, l.c.) Tex.
 1923 ————— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:610 (key, 611 U.S.A.
 (key to var.) Mexico
 Knight, Ann. Ent. Soc. Amer. 19:376 (key to varieties) N. England
 1926 ————— Blatchley, Het. E.N. Amer.: 694 (descr.)
 1926 ————— Knight, Ann. Ent. Soc. Amer. 23:825 (key)
 1930 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):176, 177 (key,
 1941 descr.) (+ 13 color var.)
 1949 ————— Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):151, 181 (key, note)
 (key 18 var.)
 1950 ————— Slater, Ia. St. Coll. Jour. Sci. 25(1):23, pl. 1, fig. 13,
 20 (♀ genitalia)
 1952 *Taedia scrupeus* Carvalho, Bol. Mus. Nac. Zool. 118:15 (n. comb.)
- semiflavifemur* Girault see *Eurystylus* Stål
- semilotus* Stål Brazil.
 1860 *Deraeocoris semilotus* Stål, K. Sv. Vet. Akad. Handl. 2(7):50 (n. sp.)
 1873 *Capsus semilotus* Walker, Cat. Het. 6:103 (list)
 1890 *Lygus semilotus* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):91 (cat.)
 1922 *Paracalocoris semilotus* Bergroth, Ark. Zool. 14(22):9 (list)
 1952 *Taedia semilotus* Carvalho, Rev. Brasil. Biol. 12(2):217 (n. comb.)
- severini* Knight N. America
 1926 *Paracalocoris severini* Knight, Ent. News 37:369 (n. sp.) var. *modestus*, *nigri-*
clawus l.c. S.D.
 1930 ————— Knight, Ann. Ent. Soc. Amer. 23:827 (key)
- stigmosa* Berg Argentina
 Paraguay
 1878 *Resthenia stigmosa* Berg, An. Soc. Cient. Arg. 6:273 (n. sp.)
 1879 ————— Berg, Hem. Arg.: 123 (descr.)
 1883 *Calocoris stigmus* Berg, An. Soc. Cient. Arg. 16:14 (note)
 1884 ————— Berg, Hem. Arg. Add. Emend.: 72 (note)
 1890 ————— Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):77 (cat.)
 1954 *Taedia Stigmosa* Carvalho & Hussey (Occ. Pap. Univ. Mich. Zool. 552:8 (list)
- sulina* Carvalho Argentina
 Brazil
 1892 *Calocoris (Paracalocoris) bimaculatus* Berg, Nova Hem. Arg. et Urug.: 87,
 110 (descr.) var. *niger*, *vittatus*
 1892 ————— Berg, An. Soc. Ci. Arg. 34:91 (descr.)
 var. *niger*, *vittatus* l.c.
 1907 *Paracalocoris bimaculatus* Reuter, Ann. Nat. Hofmus. Wien 22(1):51, var.
typica, *nigra*, *vittata* (descr.)
 *1909 *Calocoris neotropicalis* Kirkaldy, Can. Ent. 41(1):32 (n.n. for *bimaculatus*
 Fabricius (syn. by Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26(3-4):426, 1954)
 1954 *Taedia sulina* Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 26(3-4):426 (n. sp.)
- **tetrastigma* Herrich-Schaeffer see *scrupeus* (Say)
- trivittatus* Reuter Peru
 1913 *Paracalocoris trivittatus* Reuter, Ofv. F. Vett. Soc. Forh. 55A(18):4 (n. sp.)
- **trivittatus* Knight see *trivittis* Knight
- trivittis* Knight N. America
 Miss.
 *1926 *Paracalocoris trivittatus* Knight, Ann. Ent. Soc. Amer. 19:371 (n. sp.)
 1930 ————— *trivittis* Knight, Ann. Ent. Soc. Amer. 23:812 (n.n. for
Paracalocoris trivittatus Knight, preoccupied by *P. trivittatus* Reuter, 1913)
 1941 ————— *trivittis* Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):176, 178
 (key, distr.)
- virgulatus* Knight N. America
 Ariz.
 Tex.
 1930 *Paracalocoris virgulatus* Knight, Ann. Ent. Soc. Amer. 23:820 var. *stigmus*
 l.c. (n. sp.)