

- obscuricornis* Stål
 1855 *Capsus obscuricornis* Stål, Ofv. Vet. Akad. Forh. 12:36 (n. sp.) s. Africa
 1865 *Volumnus obscuricornis* Stål, Hem. Afr. 3:19 (descr.)
 1873 *Capsus obscuricornis* Walker, Cat. Het. 6:115 (list)
 1890 *Volumnus obscuricornis* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):80 (cat.)
 1905 ————— Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(12):13 (descr.)
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):41 (descr.)
- obscurus* Poppius
 1914 *Volumnus obscurus* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 44(3):111 (n. sp.) Uganda
 1952 ————— Villiers, Hém. Afr. Noire: 196, fig. 278 (descr.) W. Africa
- ruficornis* Poppius
 1912 *Volumnus ruficornis* Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):42 (n. sp.) Somaliland
 (n.e. Africa)
- straminicolor* Stål
 1855 *Capsus straminicolor* Stål, Ofv. Vett. Akad. Forh. 12:36 (n. sp.) s. Africa
 1865 *Volumnus straminicolor* Stål, Hem. Afr. 3:19 (descr.)
 1873 *Capsus straminicolor* Walker, Cat. Het. 6:115 (list)
 1890 *Volumnus straminicolor* Atkinson, Jour. Asiatic Soc. Bengal 58(2):80 (cat.)
 1905 ————— Reuter, Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 47(12):12 (descr.)
 1912 ————— Poppius, Acta Soc. Sci. Fenn. 41(3):46, fig. 4
 (descr.)
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):93 (as type)
- Genus XENOBORUS Reuter
- Type *Xenoborus commissuralis* Reuter, 1908 (monobasic)
- XENOBORUS 1908 Reuter, Can. Ent. 40:112 (as subgenus of *Neoborus* Distant)
 ——— 1916 Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 1:208; 2:351 (1917, cat.)
 ——— 1923 Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:560 (key), 567 (key to spp.)
 ——— 1926 Blatchley, Het. E.N. Amer.: 792 (key spp.)
 ——— 1941 Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):13:6, 143 (key, key spp.)
 ——— 1949 Froeschner, Amer. Mid. Nat. 42(1):147 (key spp.)
 ——— 1950 Slater, Ia. St. Coll. Jour. Sci. 25(1):19 (♀ genitalia)
 ——— 1952 Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1): (cat.)
 ——— 1955 Carvalho, Bol. Mus. Goeldi 11(2):97 (key)
- chionanthi* Knight
 1927 *Xenoborus chionantri* Knight, Proc. Biol. Soc. Wash. 40:14 var. *nigrellus* n. America
 l.c. (n. sp., n. var.) Md.
 Va.
- commissuralis* Reuter
 *1887 *Sthenarops chloris* Provancher nec Uhler, Pet. Faun. Ent. Can. 3:134 (syn. N. America
 Van Duzee, Can. Ent. 44(11):322, 1912) Ia.
 1908 *Neoborus* (*Xenoborus*) *commissuralis* Reuter, Can. Ent. 40:112 (n. sp.) Ill.
 1909 *Tropidosteptes commissuralis* Reuter, Acta Soc. Sci. Fenn. 362:51 (note) Ind.
 1917 *Xenoborus commissuralis* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 12(4):82 (note) Minn.
 1917 ————— Van Duzee, Univ. Cal. Pub. Ent. 2:351 (cat.) N.S.
 1923 ————— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:567 (key, N.Y.
 descr.) Ont.
 1926 ————— Blatchley, Hett. E.N. Amer.: 792 (descr.) Que.
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):143, 144
 (key, descr.)
 1950 ————— Slater, Ia. St. Coll. Jour. Sci. 25(1):20 (♀ ge-
 nitalia)
 1952 ————— Carvalho, An. Acad. Brasil. Ci. 24(1):93 (as type)
- neglectus* Knight
 1917 *Xenoborus neglectus* Knight, Bul. Brook. Ent. Soc. 12:82 (n. sp.) N. America
 1923 ————— Knight, Conn. Nat. Hist. Surv. Bul. 34:567 (key), Ill.
 568 (descr.) Mich.
 1926 ————— Blatchley, Het. E.N. Amer.: 793 (descr.) N.Y.
 1941 ————— Knight, Ill. Nat. Hist. Surv. Bul. 22(1):144, fig. O.
 157 (key, descr.) Ont.