

## MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, XCV: GÊNERO E ESPÉCIE NOVA DO SURINAME, COM UMA LISTA DE ESPÉCIES COLIGIDAS EM PARAMARIBO (Hemiptera)<sup>1</sup>

JOSÉ CANDIDO DE MELO CARVALHO e ALMIR FONSECA ROSAS  
Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 4 figuras no texto)

Recebemos, através de cortesia do colega P. H. van Doesburg Jr., Paramaribo, Suriname, uma pequena coleção de mirídeos para identificação. No presente trabalho apresentamos uma lista das espécies encontradas e descrevemos com ilustrações, um gênero e espécie novos ainda não registrados na literatura entomológica.

### *Urucuiana* g. n.

Mirinae, Mirini, corpo de porte médio, alongado, os hemiélitros de lados paralelos, frente e segmento I da antena fortemente pilosos, demais partes do corpo com pêlos curtos e dourados.

Cabeça horizontal, pontuda na frente, frente coberta de pêlos muito longos e grossos, vértice desprovido de carena posteriormente, com pilosidade curta e adpressa, porção posterior aos olhos prolongada em forma de pescoço, olhos fortemente granulados, removidos da margem anterior do pronoto por espaço equivalente à grossura do segmento II da antena.

Antena longa, segmento I fortemente engrossado, um pouco curvo para fora, achatado lateralmente, meio laminado, extrema base fortemente afilada, revestido por pilosidade densa, os pêlos fortes, de comprimento igual a metade ou mais da grossura do segmento, alguns deles juntando-se em tufos; segmento II cerca de 3 vezes mais longo e muito mais fino que o I, cilíndrico, com pilosidade curta, de comprimento igual ou inferior a metade da grossura do segmento; segmentos III e IV mais afilados, pilosos, cerca de 6 ou mais vezes mais curtos que o segmento II. Cabeça vista de lado, com frente visivelmente pontuda, clipeo saliente, fortemente arredondado em sua margem anterior, se-

<sup>1</sup> Recebido para publicação a 24 de maio de 1964.