parado da fronte na altura da linha inferior do pedúnculo ocular, lorum e gena salientes, semi-tuberculares, olhos atingindo a gula inferiormente; rostro no holótipo recoberto por cola (exemplar montado em cartão).

Pronoto afilado anteriormente, fortemente inclinado para frente ao nível da porção posterior do disco, fortemente rugoso, calos baixos, lisos, colar de grossura igual ao segmento II da antena, liso, margem anterior do pronoto reta, margens laterais com reintrância atrás do colar e outra menos evidente após os calos, estendendo-se daí para fora até os ângulos posteriores que são arredondados, disco com leve carena entre os calos e 2 tubérculos salientes posteriormente, um de cada lado tendo em seu meio protuberância espiniforme negra, mesoscuto totalmente descoberto, com 2 fossas ocelares, uma de cada lado, externamente, escutelo fortemente rugoso, entumescido, com linha longitudinal levemente carenada ou engrossada na porção basal mediana, ápice afilado.

Hemiélitro liso, subparalelo, levemente mais largo na região do 1/3 apical do cório, região do clavo entre a veia claval e a margem interna do mesmo mais elevada e mais densamente pilosa que o restante do hemiélitro, porção claval entre a veia e a comissura clavo-corial plana, do mesmo nível do cório e com pilosidade reduzida, veia claval com pontuação aparente embora pouco marcada, cório esparsa e curtamente piloso, embólio ligeiramente mais largo na base, fratura muito reduzida, membrana com veias relativamente grossas, areolas angulosas apicalmente.

Pernas longas, sobretudo as posteriores, cujos fêmures são bem mais fortes que os demais, tíbias cilíndricas com espinhos, pêlos curtos, o primeiro par com engrossamento visível no extremo ápice, tarsos de comprimento sub-igual, segmento III de comprimento maior que os demais, unhas e arólios do tipo Mirinae.

Espécie tipo do gênero: *Urucuiana tuberculata* sp. n.

Êste gênero pertence ao grupo dos Mirinae que possuem o pronoto grosseira e fortemente rugoso, segmento I da antena engrossado, meio laminado e provido de longa e basta pubescência.

Difere de *Clapmarius* Distant, *Eurystylomorpha* Poppius, *Neurocolpus* Reuter e *Lampethusa* Distant, todos possuidores de segmento I da antena fortemente engrossado, pela presença dos tubérculos mencionados no pronoto, fossas do mesoscuto e pela elevação peculiar da porção intravenosa do clavo.

Urucuiana tuberculata sp. n.

Caracterizada pela sua coloração, dimensões e genitália do macho.

Macho: Comprimento 5,1 mm, largura 1,6 mm. *Cabeça*: comprimento 0,6 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,32 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 1,2 mm, II, 2,3 mm, III, 0,3 mm, IV, 0,2 mm. *Pronoto*: Comprimento 0,8 mm, largura na base 1,4 mm.