

grossos que o II (antena do tipo de *Ceratocapsus* Reuter), este último cerca de 4 vezes mais longo que o I que por sua vez possui cerca da metade do comprimento do III e IV, os últimos revestidos de pilosidade muito curta, os pêlos de comprimento igual à cerca de 1/4 ou 1/5 da grossura dos segmentos.

Pronoto muito levemente pontuado, brilhante, subglabro, colar distinto, de largura igual a base do segmento II da antena, calos obsoletos, sinuado lateralmente, margem arredondada, ângulos posteriores largamente arredondados, separados do disco por uma área levemente escavada; mesoescuto coberto, escutelo plano, distintamente pontuado, com pêlos finos e erectos.

Hemiélitro distintamente pontuado, revestido de pubescência esparsa, longa, fina, erecta, cório e embólio com visível alargamento na altura do ápice do clavo, embólio distinto, levemente reflexo, cúneo cerca de 2 vezes mais longo que largo na base (nos machos) e tão longo quanto largo na base (nas fêmeas), membrana longa (macho), curta (fêmea), veias pequenas e mal delineadas. A fêmea é visivelmente braquíptera.

Pernas delgadas, fêmures posteriores levemente curvos, providos de longas e finas cerdas em sua região mediana, tíbias com espinhos muito curtos, arólios do tipo Orthotylinae. Peritrema ostiolar saliente.

Espécie tipo do gênero: Sericophanoides punctatus sp. n.

Este gênero é muito próximo de *Sericophanes* Reuter, diferindo do mesmo pela pontuação bem nítida do hemiélitro, pela estrutura do edeago (com um espículo vesical quitinizado), rostró ligeiramente mais longo e pela ausência de mancha ocelada no clavo (presente em 7 das 10 espécies conhecidas no gênero *Sericophanes* Reuter).

Ao novo gênero deverá ser transferida a espécie *Sericophanes dispersus* Carvalho, 1944 (*Rev. Brasil. Biol.*, 4 (4): 527, figs. 21-24).

Sericophanoides punctatus sp. n.

(Figs. 1-4)

Caracterizada pelo acentuado braquípterismo da fêmea, coloração e genitália do macho.

Macho: Comprimento 2,3 mm, largura 1,0 mm. *Çabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,27 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,2 mm, II, 0,9 mm, III, 0,5 mm, IV, 0,4 mm. *Pronoto*: comprimento 0,5 mm, largura na base 0,8 mm.

Coloração geral marron amarelada com áreas mais escuras no escutelo, cório e cúneo; ápice do escutelo, 1/3 basal do cório, metade basal do embólio, mancha apical do cório e embólio estendendo-se para dentro até metade da largura da base do cúneo, extremo ápice do cúneo, hialinos ao branco amarelado, nos exemplares bem preservados com uma granulação prateada muito