

MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, XCVIII: TRÊS NOVAS ESPÉCIES DAS TRIBOS BRYOCORINI E ORTHOTYLINI (Hemiptera)¹

JOSÉ C. M. CARVALHO * e ARGENTINO VIEGAS FONTES **

Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 15 figuras no texto)

Reverendo coleções hemípterológicas do Museu Paraense "Emílio Goeldi" e também alguns exemplares oferecidos ao autor senior pelo falecido colega Aristóteles Silva, os autores encontraram três espécies novas das tribos acima, cujas descrições e figuras são apresentadas neste trabalho. Os desenhos 1, 5, 11 são de autoria do desenhista Paulo Wallerstein.

Neofurius itatiaianus sp. n.

(Figs. 1-4)

Caracterizado pela sua coloração e genitália do macho.

Macho: Comprimento 4,0 mm, largura 1,4 mm. *Cabeça*: Comprimento 0,3 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,50 mm. *Antena*: Segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 0,7 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,4 mm. *Pronoto*: Comprimento 0,7 mm, largura na base 1,2 mm.

Coloração geral lutescente; mancha arredondada no meio do disco, atrás dos calos, atingindo a margem posterior do pronoto, em alguns exemplares apenas delimitada ou ausente, escutelo, área comissural do clavo além do ápice do escutelo, mancha do cório em sua área comissural e ao lado do ápice do clavo, marron ou fortemente marron-avermelhados em alguns exemplares; membrana marron-escura, veias vermelhas; olhos marron-avermelhados, ápice do clípeo e antenas avermelhados, segmento I claro-avermelhado, segmento II vermelho-marron, segmentos III e IV mais escuros; lado inferior e pernas lutescentes ao amarelo-claro, unhas, ápice do segmento III do tarso e extremo ápice do rostro,

¹ Recebido para publicação a 9 de agosto de 1967.

* Chefe de Pesquisas do Conselho Nacional de Pesquisas.

** Bolsista do CNPq.