

escuros. O escutelo apresenta as margens laterais achatadas, caindo verticalmente, fortemente enegrecidas e com ranhuras ou rugosidades.

Antenas com segmentos I e II finos, cilíndricos, de grossura igual: pronoto finamente pontuado; hemiélitros com pilosidade fina, curta, abundante e subereta, lados paralelos, embólio explanado, mais alargado para a base; rostro atingindo as coxas medianas, segmentos III e IV muito curtos e engrossados, segmento I mais longo e mais grosso que os demais, atingindo além da base da cabeça; pernas com pilosidade abundante, muito fina e longa.

Genitalia: Aedeagus (fig. 2) muito característico, com uma longa bifurcação lateral em sua região mediana, vésica simples. Hárpago esquerdo (fig. 3) grande, curvo, com base mais elevada do lado dorsal e terminado em pequena bifurcação. Hárpago direito (fig. 4) menor; com duas áreas fortemente quitinizadas próximo ao seu ápice.

Fêmea semelhante ao macho em coloração e dimensões.

Holótipo: Macho, Parque Nacional do Itatiaia, Brasil, VII-1960, Aristóteles Silva col., na coleção do Autor Senior. *Alótipo*: fêmea, mesmas indicações que o holótipo. *Parátipos*: 9 machos e 16 fêmeas, mesmas indicações que o holótipo, nas coleções do Autor Senior, do Museu Nacional, Rio de Janeiro, United States National Museum e British Museum of Natural History.

Esta espécie difere das demais do gênero *Neofurius* Distant pelo seu menor porte, coloração geral do corpo e sobretudo pela estrutura característica do aedeagus e dos hárpagos.

Sinervus amapaensis sp. n.

(Figs. 5-10)

Caracterizado pela sua coloração, estrutura do segmento I da antena e pelo comprimento do cúneo.

Macho: Comprimento 5,5 mm, largura 1,4 mm. *Cabeça*: Comprimento 0,3 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,48 mm. *Antena*: Segmento I, comprimento 0,9 mm; II, 1,4 mm; III, 1,2 mm; IV, 1,2 mm. *Pronoto*: Comprimento 0,9 mm, largura na base 0,9 mm. *Cúneo*: Comprimento 2,3 mm, largura na base 0,4 mm.

Coloração geral lutescente com manchas escuras; cabeça, pronoto e escutelo côr de tijolo, brilhantes, com áreas avermelhadas; olhos marrons, margem anterior do pronoto, área dos calos e ângulos posteriores mais claros, disco com porção central e margem posterior ao longo de sua reintrância, enegrecidos; hemiélitros lutescentes, translúcidos, clavo escuro no têrço basal internamente e em tôda a extensão de sua comissura, cório enegrecido na região apical do clavo onde forma mancha característica (fig. 5), margem basal interna do cúneo e estreita margem externa dêste último e do embólio enegrecidos, membrana