

MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, CXX: DESCRIÇÕES DE UM GÊNERO E QUATRO ESPÉCIES NOVOS (Hemiptera) ¹

JOSÉ C. M. CARVALHO * e ITALA DA PENHA GOMES **

Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 8 figuras no texto)

O presente trabalho consta da descrição de um gênero e quatro espécies novos das tribos: *Clivinemini*, *Phylini*, *Orthotylini* e *Mirini*. Os desenhos que ilustram o trabalho são de autoria de Ana Sueli Baldas e Paulo Wallerstein.

Clivinemidea g. n.

Deraeocorinae, Clivinemini. Aspecto geral de *Clivinema* Reuter, 1876. Corpo revestido de pubescência lanosa muito densa, os pêlos longos e crespos. Cabeça com olhos contíguos à margem anterior do pronoto; segmento I da antena mais grosso que os demais, segmento II levemente engrossado para o ápice; fronte fortemente saliente; clipeo horizontal e proeminente; jugo e lora bem delineadas; rostro atingindo a base das coxas medianas. Pronoto com área posterior ao sulco transversal na área dos calos fortemente intumescido, região anterior aos calos plana (fig. 2), muito mais baixa que o disco, desprovida de área gibosa avançando sobre

a cabeça, calos transversais, disco levemente sulcado longitudinalmente, pontuado, margem posterior reentrante no meio, ângulos laterais arredondados, margens laterais desprovidas de carena, também arredondadas; escutelo intumescido, fortemente sulcado nos 2/3 basais. Hemiélitro ligeiramente arredondado, externamente na região mediana, cuneo cerca de duas vezes mais longo que largo na base, membrana hialina, parte da nervura que forma o ângulo apical interno da aréola maior com um prolongamento em forma de pequena e curta veia espúria. Pernas relativamente curtas, tíbias bastante grossas, segmento III dos tarsos cerca de duas vezes mais longo que o I ou o II; unhas do tipo *Deraeocorinae* denteadas na base, arólios ausentes.

Tipo — *Clivinemidea sulina* sp. n.

Este gênero diferencia-se de *Clivinema* Reuter, 1876, do qual muito se aproxima por ter a porção anterior do pronoto na frente dos calos plana e situada em nível mais abaixo que a porção superior do disco, desprovida da intumescência gibosa característica de *Clivinema* Reuter, 1875, *Ambracius* Stal, 1860 e *Ofellus* Distant, 1883.

¹ Recebido para publicação a 26 de maio de 1970.

* Pesquisador Conferencista do Conselho Nacional de Pesquisas.

** Pesquisadora Assistente do Conselho Nacional de Pesquisas.