

Fig. 3 — *Rhinacloa bellissima* sp. n., fêmea, holótipo.

margem apical do embólio e exocório, extrema base e margem externa do cúneo, pálido-amarelados; embólio e cúneo com tinteira castanha ao avermelhado. No pronoto e escutelo marginando as áreas marrons, nota-se também leve tonalidade acastanhada. Antena pálido-amarelada, região apical do segmento II, segmento III (exceto extrema base) e segmento IV, negros. Lado inferior e pernas, pálido-amarelados; ápice do rostró, pontuações nas tíbias com espinhos emergindo dessas pontuações, 3 pontos negros na região apical superior dos fêmures, os 2 maiores convergentes (em um exemplar obsoletos), ápice dos tarsos, extrema margem superior e margem inferior da propleura, margem superior do mesoesterno, fuscas ao negro.

Corpo fortemente piloso, revestido de pêlos finos, longos e erectos, entremeados com pubescência escamiforme prateada bem visível nos hemiélitros; espinhos nas tíbias

mais longos que a grossura das mesmas; rostró atingindo as coxas posteriores; segmento II da antena muito levemente engrossado para o ápice.

Macho desconhecido.

Holótipo — Fêmea, Guadeloupe, Mus. Zool. Helsinki. *Parátipo*: Fêmea, mesmas indicações que o holótipo, na coleção do primeiro Autor.

***Hadronemidea corcovadensis* sp. n.**

(Fig. 4)

Caracterizada por sua dimensão e coloração geral.

Fêmea — Comprimento 5,7 mm, largura 2,0 mm. *Cabeça*: Comprimento 0,3 mm, largura 1,1 mm, vértice 0,60 mm. *Antena*: Segmento I, comprimento 0,7 mm; II, 1,7 mm; III, 1,4 mm; IV, 0,6 mm. *Pronoto*: Comprimento 0,9 mm, largura na base 1,5 mm.




Fig. 4 — *Hadronemidea corcovadensis* sp. n., fêmea, holótipo.