

Coloração geral prêto-opaca, tendendo ao marrom-escuro com áreas pálido-amareladas ao lutescente; mancha na margem interna do ôlho e na carena do vértice, linha mediana do pronoto atrás dos calos, faixa mediana no mesoescuto, escutelo, embólio, margem externa do cúneo, lora, búcula, base da joga, gena, gula, segmento I e II do rostro, xifo do prosterno, margem inferior da propleura, coxas, trocânteres e base dos fêmures, pálido-amarelados ao lutescente.

Rostro atingindo o mesosterno, ao nível da base das coxas medianas; corpo com cerdas erectas e pêlos prateados lanosos; segmento I da antena completamente e o II apenas até o 1/3 apical, com cerdas erectas de comprimento cêrca de duas vêzes ou mais a grossura do segmento; 1/3 apical do segmento II, todo o III e IV, com pubescência muito fina.

Macho desconhecido.

Holótipo: Fêmea, Corcovado, XII-57, C. A. Seabra e M. Alvarenga col., na coleção do primeiro Autor.

Esta espécie se diferencia de *Hadrone-midea esau* Reuter, 1909, do México pela coloração do pronoto, da propleura e do escutelo.

Henicocnemis conspurcata sp. n.

(Figs. 5-8)

Caracterizada pelas suas dimensões, coloração geral e estrutura da genitália do macho.

Macho — Comprimento 6,1 mm, largura 2,4 mm. *Cabeça:* Comprimento 0,8 mm, largura 1,2 mm, vértice 0,52 mm. *Antena:* Segmento I, comprimento 0,6 mm; II, 1,5 mm; III, 0,8 mm; IV, mutilado. *Pronoto:* Comprimento 1,4 mm, largura na base 2,1 mm.

Coloração geral marrom com áreas pálido-amareladas e castanho-avermelhadas;




Fig. 5 — *Henicocnemis conspurcata* sp. n., macho, holótipo.

cabeça pálido-amarelada com estrias oblíquas na fronte e faixas longitudinais no clipeo, lora, gena e búcula marrons; antena marrom, metade basal dos segmentos II e III pálido-amarelados e extrema base dos mesmos segmentos branco-leitosa; pronoto castanho-avermelhado ao lúteo-avermelhado; colar, área anterior e posterior dos calos, faixa longitudinal mediana do disco e margem posterior, incluindo os ângulos laterais, marrom-escuros; escutelo uniformemente marrom ao castanho; hemiélitros marrons com pontuações arredondadas e duas ou três pequenas faixas oblíquas na sua base pálido-amareladas ao branco-leitoso; membrana fusca, ápice da veia da aréola maior branco-leitosa; mancha junto ao ápice do cúneo, mais clara. Lado inferior marrom, propleura castanho-avermelhada, abdome com uma série de faixas oblíquas ou transversais nos segmentos, branco-leitosas; peritrema ostiolar pá-