

MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, CXXXII: DESCRIÇÃO DE UM GÊNERO E TRÊS ESPÉCIES NOVAS DO BRASIL (Hemiptera) ¹

JOSÉ C. M. CARVALHO * e ITALA DA PENHA GOMES **

Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 7 figuras no texto)

No presente trabalho os autores descrevem um gênero e três espécies novas de mirídeos da fauna brasileira. As ilustrações que figuram no texto são de autoria de Ana Sueli Baldas.

Adtaedia g. n.

Mirinae, Mirini. Corpo alongado, revestido de pubescência longa e erecta, formada por cerdas, que vistas sob luz incidente dão o aspecto de dois tipos de pilosidade: cerdas simples, erectas e pêlos semi-adpressos prateados.

Cabeça afilada na frente, horizontal, olhos contíguos com a margem anterior do pronoto, clípeo entumecido, fortemente desenvolvido, saliente; rostro alcançando as coxas medianas, segmento I atingindo a base das coxas anteriores, vértice plano, desprovido de cerdas ou carena. Antenas com segmentos cilíndricos, revestidos de pêlos mais longos que a grossura dos segmentos; segmento I bastante mais grosso que os demais, levemente engrossado para o ápice, de

comprimento aproximadamente igual a largura da cabeça, duas vezes mais longo que o segmento II, este último levemente engrossado para o ápice.

Pronoto liso, bastante afilado para a frente, colar largo, bem diferenciado, densamente revestido de cerdas erectas, calos obsoletos com duas pequenas escavações além de suas margens posteriores, ângulos posteriores largamente arredondados, margem posterior do disco com leve reintrância na região mediana. Escutelo pouco saliente, plano, bastante afilado para o ápice. Mesoscuto encoberto.

Hemiélitros com embólio distintamente aplainado na base, confundindo-se com o cório na metade apical; cúneo cêrca de duas vezes mais longo que largo na base.

Lado inferior com peritrema ostiolar bem desenvolvido, fêmures engrossados, sobretudo os posteriores que são bem mais fortes que os demais, juntamente com as tíbias, fortemente pilosos, as cerdas das tíbias mais longas que a grossura dos segmentos, arólios do tipo Mirini, divergentes para o ápice.

Espécie tipo do gênero: *Adtaedia itaiensis* sp. n.

Este gênero aproxima-se pelo seu aspecto geral de *Taedia* Distant, 1883, dife-

¹ Recebido para publicação a 16 de fevereiro de 1971.

* Pesquisador Conferencista do Conselho Nacional de Pesquisas.

** Pesquisador Assistente do Conselho Nacional de Pesquisas.