

terior aos calos; embólio, extrema base e extrema margem externa do exocório, pálido-amarelados a branco-leitosos; cúneo castanho. Lado inferior marrom-escuro a negro; margem inferior da propleura, extremo ápice das covas e extrema base dos fêmures, pálidos; pernas pálido-amareladas; tibias levemente mais escuras.

Corpo revestido de cerdas eretas entremeadas de pilosidade prateada sob luz incidente; carena do vértice distinta, com cerdas eretas; tibias posteriores com espinhos e pêlos normais.

Macho: desconhecido.

Holótipo: fêmea, Santiago, Chile, XI-52, Kushel. col.

Parátipos: duas fêmeas, mesmas indicações que o holótipo.

Esta espécie diferencia-se das demais do gênero, pela sua coloração, notadamente pela faixa branco-leitosa na margem posterior do vértice e ao longo do embólio.

***Orthotylus guaranianus* n. sp.**

(Figs. 2-5)

Caracterizada pela sua coloração, pelas dimensões e pela estrutura da genitália do macho.

Macho: comprimento 4,5-4,7 mm; largura 1,5-1,6 mm. *Cabeça:* comprimento 0,4-0,6 mm; largura 1,1 mm; vértice 0,41 mm. *Antena:* segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,2-1,3 mm; III, 0,8-0,9 mm; IV, 0,2-0,3 mm. *Pronoto:* comprimento 0,6-0,7 mm; largura na base 1,3-1,5 mm.

Coloração geral marrom-escura, com áreas pálido-amareladas; duas faixas longitudinais largas na cabeça, junto à margem interna dos olhos; margem do pronoto, sobretudo as laterais e posterior, faixa longitudinal mediana no disco atrás dos calos, comissura clavo-corial, embólio, extremo ápice

do cório e extrema base do cúneo (em alguns exemplares o embólio, a margem externa do cúneo e o ápice do escutelo), pálido-amarelados. Lado inferior marrom-escuro, lados da cabeça (exceto do clípeo que é negro), ápice das coxas, base e ápice dos fêmures, pálido-amarelados.

Genitália: pênis (fig. 3) do tipo Orthothylini, com quatro ramificações esclerosadas e providas de tubérculos cteniformes ou espiniformes. Parâmero esquerdo (fig. 4) bifurcado na região subapical. Parâmero direito (fig. 5) curvo e revestido de cerdas dorsais.

Fêmea: comprimento 3,8-4,2 mm; largura 1,3-1,4 mm. *Cabeça:* comprimento 0,3-0,4 mm; largura 0,9 mm; vértice 0,49-0,68 mm. *Antena:* segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,0-1,2 mm; III, 0,8-0,9 mm; IV, 0,3-0,4 mm. *Pronoto:* comprimento 0,6 mm; largura na base 1,0-1,2 mm.

Coloração geral marrom-escura a fusca, com áreas pálido-amareladas duas faixas longitudinais largas na cabeça, junto à margem interna dos olhos, pálido-amareladas; extrema base e extremo ápice externamente, e margem lateral (finamente) do cúneo, pálido-amarelados; embólio ligeiramente mais claro que o cório; pilosidade pálida. Lado inferior, marrom-escuro; juga, lora e gena, extrema margem inferior da propleura, coxas e base dos fêmures, pálido-amareladas; rostro, porção apical dos fêmures, tibias e tarsos, fuscos a negros. As antenas, exceto extrema base do segmento I, clípeo, região central da fronte e região mediana do vértice, marrom-escuros a negros.

Características morfológicas idênticas às descritas para o gênero, destacando-se a pilosidade sob a forma de cerdas densas, longas, finas e eretas; corpo liso com indicações de pruinosidade pálida entre os pêlos.

Holótipo: macho, Paraguai, Horqueta, 1938, Alberto Schulze. *Alótípico:* fêmea, Goiás, Brasil, R. Verde, Carvalho. *Parátipos:*