

quatro machos, mesmas indicações que o holótipo; um macho, mesmas indicações que o alótipo.

Esta espécie diferencia-se de *Orthotylus pamparum* (Berg, 1883), pela coloração e pela estrutura da genitália do macho.

***Orthotylus nigrescens* n. sp.**

(Figs. 6-9)

Caracterizada pela sua coloração, pelas dimensões e pela estrutura da genitália do macho.


Macho: comprimento 3,6 mm; largura 1,2 mm. *Cabeça*: comprimento 0,3 mm; largura 0,9 mm; vértice 0,45 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 0,9-1,0

mm; III, 0,6 mm; IV, 0,3 mm. *Pronoto*: comprimento 0,5 mm; largura na base 1,0 mm.

Coloração geral marrom-escura a negra, com áreas pálido-amareladas; pequenas manchas na cabeça, junto à margem interna dos olhos e à margem inferior da búcula, pálido-amareladas (em alguns exemplares, a face posterior dos olhos, uma faixa mediana no disco, atrás dos calos, e a faixa longitudinal mediana apical, no escutelo, pálido-amareladas); comissura clavo-corial e embólio, ligeiramente mais claros que o restante do hemiélitro.

Corpo revestido de cerdas rijas e erectas, entremeadas com pêlos de coloração prateada, sob luz incidente.

Genitália: pênis (fig. 7) do tipo *Orthotylini*, com cinco ramificações providas de



Orthotylus guaranianus n. sp.: Fig. 2 — macho holótipo; fig. 3 — pênis; fig. 4 — parâmero esquerdo; fig. 5 — parâmero direito.