

projetando-se para fora, margem posterior do disco largamente reentrante; mesoescuto descoberto, obliquamente carenado dos lados, escutelo pequeno, projetado para cima, ápice rombudo; hemiélitros sem cúneo diferenciado, membrana extremamente reduzida, apenas cobrindo o ápice do abdome; embólio plano, diferenciado, estreitando-se para o ápice; nervura claval com indicação de uma fileira de pontuações impressas; pernas mutiladas no holótipo; peritrema ostiolar reduzido, coxas anteriores muito mais fortes que as demais, visivelmente engrossadas na porção basal anterior, propleura alongada, cerca de duas vezes mais longa que larga, xifo do prosterno com um V-carenado bem marcado.

Espécie-tipo do gênero: *Incafulvis peruvianus* n. sp.

Difere dos demais gêneros da tribo pela conformação peculiar do pronoto. Difere de *Rhinofulvius* Reuter pela conformação do disco e pelo comprimento do rostro.

***Incafulvis peruvianus* n. sp.**

(Fig. 1)

Caracterizada pela coloração geral do corpo.

**Fêmea:** Comprimento 3,2 mm, largura 1,0 mm. **Cabeça:** Comprimento 0,6 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,24 mm. **Antena:** Segmento I, comprimento 0,3 mm; II = IV, mutilados. **Pronoto:** Comprimento 0,6 mm, largura na base 0,7 mm. **Cúneo** ausente.

Coloração geral castanha com áreas e pontuações pálido-amareladas; cabeça, pronoto e escutelo, castanho-escuros, collar e margem posterior do pronoto (tenuamente), pálido-amarelados; hemiélitros mais claros na região do clavo e endocório, com pontuações pálidas na base das cerdas e uma faixa esbranquiçada, transversal característica no cório ao nível da extremidade distal da comissura, membrana fusca, pálida na parte apical; lado inferior do corpo, castanho,

coxas pálido-amareladas, o par anterior negro na porção basal anterior.

Características morfológicas como mencionadas para o gênero.

*Macho* desconhecido.

**Holótipo** fêmea, Peru, Monson Valley, Tingo Maria, XII. 1954, E. I. Schlinger & E. S. Ross coll., na coleção da "California Academy of Sciences".

***Henicocnemis peruvianus* n. sp.**

(Figs. 2-5)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

**Macho:** Comprimento 5,2 mm, largura 2,0 mm. **Cabeça:** Comprimento 0,4 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,30 mm. **Antena:** Segmento I, comprimento 0,6 mm; II, 1,6 mm;




Fig. 1 — *Incafulvis peruvianus* n. sp., fêmea, holótipo.