

terior e posteriormente faixas pálidas deprimas; mesoescuto coberto; escutelo pardo com depressão basal dividida ao meio (por estreita faixa marrom) e duas depressões laterais pálido-amareladas; hemiélitros pardos, mais claros na porção basal, clavo junto ao escutelo e porção apical do cório e embólio enegrecidos, escutelo pardo-escuro, com mancha grande pálido-amarelada na porção basal externa, membrana fusca, com pequena mancha clara junto ao ápice do cúneo. Lado inferior pardo, porção mediana do mesoesterno, coxas, terebra, pigóforo e lados do abdome, pardo-escuros, pernas pardas, os fêmures com pontuações negras.

Rostro atingindo as coxas medianas, margem posterior do pronoto avançados sobre o escutelo, demais caracteres como mencionados para o gênero.

Genitália: Pênis (fig. 11) do tipo Phyllini, vésica alongada com extremidade do gonoporo secundário subapical. Parâmero esquerdo (fig. 12) típico conforme mostra a ilustração. Parâmero direito (fig. 13) pequeno, globoso, muito afilado para o ápice, com cerdas longas.

Fêmea semelhante ao macho em coloração e aspecto geral. Comprimento 2,6 mm, largura do vértice 0,52 mm.

Holótipo macho, Guatemala, Nueva Concepcion, 50', VIII. 1963, D. D. Cavagnaró e M. E. Irwin col., na coleção da Academia de Ciências da Califórnia, San Francisco. **Alótípico:** idem, fêmea. **Parátipos:** 1 fêmea, idem, na coleção do autor.

Difere de *Semium subglaber* Knight, 1927 pela coloração e morfologia da genitália do macho.

Stittocapsus incaicus n. sp.

(Fig. 14)

Caracterizada pela mancha branca do cúneo.

Fêmea: Comprimento 4,7 mm, largura 2,0 mm. **Cabeça:** Comprimento 0,4 mm, lar-

gura 1,0 mm, vértice 0,44 mm. **Antena:** Segmento I, comprimento 1,0 mm; II, 2,4 mm; III, 0,8 mm. IV, mutilado. **Pronoto:** Comprimento 0,6 mm, largura na base 1,4 mm. **Cúneo:** Comprimento 0,40 mm, largura na base 0,48 mm.

Coloração geral castanha com áreas pálido-amareladas; cabeça castanho-clara, fronte com estriações oblíquas castanhelas, clípeo e porção ântero-inferior da cabeça, castanho-escuros, olhos e antenas negros, extremidade basal dos segmentos II-IV pálida, porção mediana dos segmentos II-III castanho-clara; pronoto castanho-claro no disco, colar pálido-amarelado, áreas dos calos, ângulos umerais e margem posterior do disco na parte mediana (tenuamente) castanho-




Fig. 14: — *Stittocapsus incaicus* n. sp., fêmea, holótipo.