

dial até o nível do ápice do clavo, uma mancha de cada lado da comissura corial e duas manchas na extremidade apical externa do cório e do embólio, mancha na porção basal interna e ápice do cúneo, porção apical da nervura da membrana, pálido-amarelados; membrana fusca.

Lado inferior castanho, porção marginal da propleura, margem das fendas coxais, pequena mancha posterior da mesopleura e peritrema ostiolar, pálidos a branco-leitosos; abdome tendendo a avermelhado com uma faixa longitudinal lateral pálida e outra correspondente, mais acima, irregular, de coloração negra; pernas castanhas, trocanteres pálidos, fêmures com a porção apical tendendo a avermelhado, com duas faixas pálidas (mediana e subapical), tíbias pálido-amareladas com pontuações negras na base dos espinhos; tarsos pálidos, segmento apical fusco.

Os hemiélitros são revestidos de pubescência adpressa (dourada sob luz incidente); rostrando alcançando o VIII segmento abdominal; segmento II da antena cilíndrico; margem posterior do vértice grosseiramente carenada; olhos grandes, alcançando inferiormente o nível da margem inferior do loro.

Genitália: Vésica do aedeagus (fig. 11) com gonoporo típico, dois espículos esclerosados e lobos membranosos. Parâmero esquerdo (fig. 12) pouco curvo, mais fino na região mediana. Parâmero direito (fig. 13) simples, mais esclerosado na parte apical.

Fêmea desconhecida.

Holótipo macho, Cucui, Rio Negro, Amazonas, J. C. M. Carvalho col., 1951.

Difere das demais espécies neotropicais do gênero pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Taedia cajabiana n. sp.

(Figs. 14-18)

Caracterizada pela coloração do pronoto e pela morfologia da estrutura do macho.

Macho: Comprimento 5,1 mm, largura 2,2 mm. *Cabeça:* Comprimento 0,4mm, largura 0,9 mm, vértice 0,36 mm. *Antena:* Segmento I, comprimento 0,6 mm; II, 1,1 mm; III, 0,9 mm; IV, mutilado. *Pronoto:* Comprimento 1,0 mm, largura na base 1,7 mm. *Cúneo:* Comprimento 0,72 mm, largura na base 0,64 mm.

Coloração geral castanha, salpicada com manchas ou pontuações pálido-amareladas; cabeça pálida, fronte com estriações vermelhas, clipeo castanho-escuro, duas manchas anteriores na fronte, base e faixa longitudinal no jugo, faixa longitudinal inferior e anterior no loro, duas manchas subapicais no clipeo, faixa inferior na búcula, faixa longitudinal na gena, duas faixas longitudinais laterais no pescoço e região mediana da gula, pálido-amarelados; olhos e antenas castanhos, segmentos I-IV com pequena mancha branca subasal, segmento I tendendo a castanho-avermelhado para o ápice, segmento II negro do terço apical; pronoto com pontuações e manchas pálido-amareladas bem marcadas no colar e parte lateral do disco, duas manchas negras depressas bem marcadas atrás dos calos, região mediana do disco e ângulos umerais castanho-escuros, área lateral contígua a mancha as manchas negras e margem posterior do disco (finamente) pálidas a lutescentes; mesoescuto negro com duas manchas pálidas; escutelo castanho com pontuações, pequenas manchas, linha mediana e parte apical, pálidos; hemiélitros castanhos salpicados com pontuações pálido-amareladas; membrana fusca, nervuras na parte apical e mancha junto ao ápice do cúneo, pálidas.

Lado inferior castanho com numerosas manchas pálido-amareladas; propleura com duas a três faixas longitudinais pálido-amareladas, região lateral do mesoesterno com mancha branca semilunar encinada por uma mancha negra arredondada característica; mesopleura com duas faixas verticais, peritrema ostiolar e metapleura e abdome com manchas pálidas, neste último dispostas em