



*Polymerus carpinteroi* n. sp. — Fig. 15: Pênis; fig. 16: parâmero esquerdo; fig. 17: parâmero direito.

Coloração geral castanho-escura a preta com áreas pálido-amareladas; cabeça pálida com o clipeo e duas manchas longitudinais (uma de cada lado) na fronte, coalescentes na base do clipeo castanho-escuros, juga e lora com mancha ou faixa avermelhada, laivos avermelhados ocorrem também de cada lado das faixas frontais, faixa na búcula, pequena faixa oblíqua na gena e porção inferior da gula castanhos; rostró castanho com segmento I avermelhado; olhos castanhos; antena pálido-amarelada com extremidades basal e apical do segmento I, extremidade basal do segmento II negros.

Pronoto castanho escuro, colar, duas manchas sobre os calos externamente, três faixas longitudinais no pronoto (a mediana percorrendo do colar à margem posterior), margem posterior do disco estreitamente pálido-amarelada; mesoscuto negro com duas manchas avermelhadas; escutelo pálido-amarelado com duas faixas longitudinais negras unidas na porção basal onde formam uma mancha negra comum com o mesoscuto.

Hemiélitros castanho escuros, faixa longitudinal percorrendo a nervura claval, duas faixas oblíquas maiores na base do endocório, comissura corial, quatro manchas oblíquas menores no cório (as duas menores junto ao ápice do clavo, extremidade apical externa do cório e embólio (exceto pequena mancha negra subapical) pálido-amareladas; cúneo pálido-amarelado, com mancha ocelóide castanho escura na porção basal externa, possuindo em sua margem interna área avermelhada; membrana fusca com nervuras pálido-amareladas.

Lado inferior castanho escuro, fendas coxais, margem superior e posterior da propleura, margem

posterior da mesopleura, peritrema ostiolar, faixa longitudinal lateral do abdômen e mancha no pigóforo, pálido-amareladas; coxas negras, fêmures negros na porção basal, pálidos na metade apical, onde são vistos dois anéis castanhos com laivos avermelhados; tíbias pálido-amareladas, com pequena mancha basal avermelhada, espinhos pretos com pontuações fuscas em suas bases; tarsos pálidos enfuscados na parte apical.

**Genitália:** Pênis (fig. 15) com gonoporo secundário característico, terminado por um prolongamento com denticulos, vésica com um espículo esclerosado afilado para o ápice, lobos membranosos com denticulos apicais. Parâmero esquerdo (fig. 16) falciforme, ápice afilado. Parâmero direito (fig. 17) pequeno, ápice esclerosado.

**Holótipo** macho, República Argentina: Merlo, San Luis, 1972, na Coleção do Museu Argentino de Ciências Naturais "Bernardino Rivadavia", Buenos Aires.

Difere de *Polymerus amazonicus* Carvalho, 1976 pela coloração do escutelo e da cabeça, bem como pela morfologia da genitália do macho. O nome desta espécie é dado em homenagem a nosso colega Diego Leonardo Carpintero em reconhecimento à sua contribuição para o conhecimento dos mirídeos argentinos.

#### ***Prepops subandinus* n. sp.**

(Figs. 18-21)

Caracterizada pela coloração vermelho-alaranjada do hemiélitro e pela morfologia da genitália do macho.