

Genitalia: Pigóforo (fig. 3) com tubo anal muito prolongado, de comprimento maior que a do segmento IX. Pênis (fig. 4) com espículo mediano afilado e curvo no ápice. Parâmero esquerdo (fig. 5) falciforme, afilado na extremidade apical. Parâmero direito (fig. 6) pequeno, menos esclerosado na base, ventralmente, terminado em ponta rombuda.

Fêmea desconhecida.

Holótipo: Macho, Pomacochas, Peru, 25.VII.70, David Ojeda, 323.70, na coleção do autor.

Parátipos: 2 machos, mesmas indicações que o holótipo e Pomacochas, 25.VII.70, E. Pisfil D: 323.70, na coleção do autor.

Diferencia-se das demais espécies do gênero pela coloração do escutelo e estrutura da genitália do macho. O tubérculo do escutelo (fig. 2) é completamente negro.

***Hyaliodocoris elongatus* n. sp.**

(Figs. 7-11)

Caracterizada pela coloração do pronoto e pela estrutura da genitália do macho.

Macho: Comprimento 5,8 mm, largura 2,2 mm. **Cabeça:** comprimento 0,4 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,20 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,4 mm; III, 0,6 mm; IV, mutilado. **Pronoto:** comprimento 1,0 mm, largura na base 1,6 mm. **Cúneo:** comprimento 1,08 mm, largura na base 0,60 mm. **Embólio:** comprimento 0,24 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada com áreas castanho-escuras; cabeça pálida, região frontal, negra, com uma mancha em forma de V e pescoço negro, olhos castanhos; antena negra, exceto base e ápice do segmento I; pronoto castanho-escuro com duas manchas medianas (separadas por uma linha mediana fusca) margem posterior e ângulos umerais pálido-amarelados; escutelo negro; hemélitro pálido-amarelado, translúcido, base do clavo até o ápice do escutelo e extrema base do cório e embólio negros (em um exemplar o extremo ápice do clavo é também fusco); embólio, cúneo e membrana translúcidos. Lado inferior pálido a ocráceo, região superior da área esternal e propleura negros a castanhos, pernas pálido-amareladas.

Hemélitro muito longo e explanado; embólio na base aproximadamente tão largo quanto o diâmetro de um olho; cúneo grande; membrana




Fig. 7 - *Hyaliodocoris elongatus* n. sp., macho, holótipo.

acentuadamente longa; escutelo intumescido, rostró alcançando as coxas medianas, olhos ocupando toda a região lateral da cabeça, segmento II da antena densamente piloso.

Genitalia: Pigóforo (fig. 8) com tubo anal muito longo, de comprimento maior que o do segmento IX. Pênis (fig. 9) com dois lobos membranosos e um espículo esclerosado característico. Parâmero esquerdo (fig. 10) falciforme, terminado em ponta aguda. Parâmero direito (fig. 11) pequeno, simples, afilado para o ápice.

Fêmea desconhecida.

Holótipo: Macho, Colômbia, 30 km W Bogotá, Mosquera, 1800 m, Mar., 65, J.A. Ramos, na coleção do autor. **Parátipo:** macho, mesmas indicações que o holótipo.

Difere das demais espécies do gênero pela coloração do pronoto, pelo embólio muito largo e pela estrutura da genitália do macho.

O nome específico relaciona-se com seu corpo bastante alongado.

***Botocodomiris clypeatus* Carvalho, 1979**

(Figs. 12-13)

Botocodomiris clypeatus Carvalho, 1979: 479-481 (macho)