

Genitália: penis (fig. 4) com vésica provida de dentículos esclerosados. Parâmero esquerdo (fig. 5) falciforme, com ranhuras esclerosadas na porção mediana interna. Parâmero direito (fig. 6) característico, com dentículos apicais.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Vera, Mato Grosso, BRASIL, Alvarenga & Roppa col., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Espécie muito próxima de *Tucuruiella tapajoensis* n. sp. na coloração geral e tamanho, diferenciando-se pela estrutura da genitália, sobretudo dos parâmeros esquerdo e direito.

O nome trivial é dado em alusão ao Estado de Mato Grosso, onde a espécie foi coligida.

***Tucuruiella tapajoensis* n. sp.**

(Fig. 7 - 12)

Caracterizada pela coloração geral e pela estrutura da genitália do macho.





Fig. 7 — *Tucuruiella tapajoensis* n. sp., holótipo, macho.



Tucuruiella tapajoensis n. sp.: Fig. 8 — Penis; Fig. 9 — Parâmetro esquerdo; Fig. 10 — Parâmetro direito.

Macho: comprimento 3,6 mm; largura 1,1 mm. **Cabeça:** comprimento 0,4 mm; largura 0,8 mm; vértice 0,30 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,2 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,5 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm; largura na base 1,0 mm. **Cúneo:** comprimento 0,40 mm; largura na base 0,20 mm (holótipo).

Coloração geral castanha, tendendo ao cinamómeo, com faixas claras; segmento I da antena pálido-amarelado (em alguns exemplares), com mancha vermelha sub-basal inferiormente; hemiélitros com faixa transversal apical no cório e duas manchas basais (uma de cada lado) no endocório pálidas; membrana fusca, área basal intrareolar e marginal pálidas. Lado inferior castanho, peritrema ostiolar e coxas pálido-amarelados; fêmures e tíbias castanhos.

Pubescência composta de pêlos adpressos e cerdas erectas, bem visíveis, no ângulo anterior do pronoto e margem interna do cúneo; pronoto e hemiélitros finamente pontuados; rostro atingindo as coxas posteriores.

Genitália: penis (fig. 8) com vésica tendo espículo esclerosado e revestido de dentículos esclerosados. Parâmero esquerdo (fig. 9) falciforme, alongado. Parâmero direito (fig. 10) característico, bifurcado no ápice, um dos lobos com dentículos.