



Fig. 1 — *Orthotylus manauensis* n. sp., macho, holótipo.

Holótipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. das Laranjeiras (Manaus), 4.IV.81, Arias col., na coleção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, coleção entomológica. **Parátipos:** 10 machos e 11 fêmeas, mesmas indicações que o tipo, nas coleções do INPA, Museu Nacional, Rio de Janeiro e JCMC.

Difere das demais espécies do gênero pelas características da vésica do edeago e dos parâmetros.

O nome específico é alusivo à cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas.

PARAPROBA AMAZÔNICA n. sp. (Figs. 7-10)

Caracterizada pela coloração do corpo e morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 4,2 mm, largura 1,2 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,20. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,1 mm; III 0,9 mm; IV, 0,2 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm, largura na base 1,1 mm. **Cúneo:** comprimento 0,68 mm, largura na base 0,28 mm (holótipo).

Coloração geral pardo-amarealada a cinamôneo com áreas castanhas e negras; cabeça negra, olhos castanhos, segmento I da antena pardo-amarelado, demais segmentos negros.

Pronoto pardo-amarelado a citrino, ângulos umerais escuros, mesoescudo da mesma cor, escutelo citrino com porção apical negra.

Hemielítros pálido-amarelados a cinamôneo, clavo negro, parte basal do exoclavo pálida e cório pálidos, este último com faixa transversal ao nível da comissura (atingindo o embólio) escura, cúneo pálido-amarelado, negro na margem interna subapical e no ápice: membrana fusca com mancha clara além do ápice do cúneo.

Lado inferior pálido-amarelado, metapleura com mancha escura, rosto pálido-amarelado, extremidade apical negra. Pernas pálido-amareladas, extremidades das tibias e dos tarsos mais escuros.

Corpo com pilosidade semi-erecta, cúneo cerca de três vezes mais longo que largo na base, aréola