

fêmea, P. das Laranjeiras, 4.IX.81. Jorge Arias, na coleção do Museu Nacional e do INPA.

Difere das demais espécies do gênero pelo seu porte diminuto, pela coloração do corpo e pela morfologia da vésica do edeago.

O nome específico é alusivo à cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas.

**TAEDIA RONDÔNIA** n. sp.  
(Figs. 15-18)

Caracterizada pela coloração e morfologia da genitália do macho.

**Macho:** comprimento 7,6 mm, largura 2,9 mm. **Cabeça:** comprimento 0,7 mm, largura 1,1 mm, vértice 0,44 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 1,1 mm; II, 2,4 mm; III, 1,8 mm; IV, mutilado. **Pronoto:** comprimento 1,4 mm, largura na base 2,0 mm. **Cúneo:** comprimento 1,12 mm, largura na base 0,96 mm (holótipo).

Coloração geral castanho-clara com pontuações pálido-amareladas e mancha esverdeada no pronoto; cabeça lutescente, olhos e antenas castanhos, segmento I negro na extrema base, segmento II negro na parte apical, com anel branco na base, segmento III e IV pálidos.

Pronoto com colar e área dos calos lutescentes, disco com duas manchas escavadas, uma atrás de cada caio, região mediana e poste-

rior com tonalidade esverdeada, margem posterior junto aos ângulos umerais escura; mesoescuto castanho no meio e pálido dos lados, escutelo castanho com duas manchas basais e ápice lutescentes.

Hemiélitros com clavo e cório tendo numerosas pontuações pequenas e arredondadas pálido-amareladas, embólio castanho, cúneo tendendo ao vermelho com manchas escuras e pontos lutescentes, paracúneo mais escuro com mancha lutescente junto ao seu ângulo interno; membrana fusca, pálida na superfície da pequena aréola e porção contígua ao ápice do cúneo, nervuras castanhas, pálidas na parte apical, além do início da aréola menor.

Lado inferior pálido amarelado.

Corpo com pubescência curta e semi-erecta, pronoto com cerdas semi-recumbentes na região do colar, rostro alcançando as coxas posteriores, cúneo pouco mais longo que largo na base.

**Genitália:** pênis com vésica (Fig. 16) tendo dois espículos característicos e lobos membranosos. Parâmero esquerdo (Fig. 17) curvo, com lobo basal pequeno, ápice rombudo e pequenos dentículos marginais subapicais. Parâmero direito (Fig. 18) pequeno, engrossado.

**Fêmea:** desconhecida.