

Holótipo: macho, BRASIL, Território Federal de Rondônia (atual Estado de Rondônia), 11.09.63, col. Eduardo 2797, na coleção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus.

Difere de *Taedia coimbrai* Carvalho, 1975 e *Taedia lenticulosa* (Stål, 1860) pela coloração e morfologia da genitália do macho.

O nome específico é alusivo a região onde foi coligida.

TAEDIA MANAUARA n. sp.
(Figs. 19-22)

Caracterizada pela coloração do pronoto e pela morfologia da vesícula do edeago.

Macho: comprimento 5,9 mm, largura 2,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,4 mm, largura 1,0 mm, vértice 0,36 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,6 mm; II — IV mutilados. **Pronoto:** comprimento 1,2 mm, largura na base 1,6 mm. **Cúneo:** comprimento 0,68 mm, largura na base 0,40 mm (holótipo).

Coloração geral castanho-escura com áreas pálido-amareladas a lutescentes; cabeça preta com pequena mancha pálida longitudinal na base do vértice continuada por mancha idêntica no colar, olhos castanho-escuros, jugo com pequena faixa longitudinal pálida inferiormente, antena de coloração negra, segmento I pálido na porção basal (ou totalmente), com anel negro subapical.

Pronoto castanho-escuro com larga faixa longitudinal pálido-amarelada na porção mediana do disco, tendo atrás dos calos, três faixas brancacentas: as duas laterais de extensão variável, podendo ser apenas dois pontos pálidos, a mediana estendendo-se até o colar. No holótipo existem ainda quatro pontuações pálido-amareladas a citrinas: duas no ângulo anterior e duas no meio da margem dos calos, margem posterior estreitamente pálido-amarelada; mesoescuto castanho, escutelo castanho com faixa pálida longitudinal larga incluindo em seu meio uma estreita faixa longitudinal castanha, extremo ápice pálido.

Hemiélitro castanho-escuro na região do clavo e do endocório, pálido amarelado no exocório e no embólio, cúneo e metade interna, membrana fusca.

Lado inferior castanho-escuro, propleura com quatro linhas brancas longitudinais na porção anterior, porção inferior, placa basilar e peritrema ostiolar brancos, coxas e pernas pálido-amareladas, fêmures com duas faixas castanhas ou avermelhadas na porção apical, tíbias castanhas ou pálidas, abdômen castanho com faixa lateral superior tendo duas fileiras de manchas castanhas irregulares, pigóforo castanho-claro.

Corpo revestido de pubescência densa, fina e semierecta, cúneo