

cerca de uma vez e meia mais longo que largo na base, rostro alcançando as coxas posteriores.

Genitália: pênis (Fig. 20) com vésica membranosa provida de uma área esclerosada alongada. Parâmero esquerdo (Fig. 21) com lobo basal largo, metade apical afilada. Parâmero direito (Fig. 22) pequeno, estreitado no meio, ápice com ponta fina, recurva.

Fêmea: semelhante ao macho em aspecto geral e coloração, porção apical dos fêmures e basal das tíbias castanhas, com pontuações pálido-amareladas.

Holótipo: macho, BRASIL, Reserva Ducke, Manaus, Amazonas, L.P. Albuquerque & A. Faustino, 29.IV.1968 (2826), na coleção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. **Parátipos:** 1 macho e 1 fêmea, Brasil, Amazonas, AM 010 Km 26, Reserva Ducke, 14.II.1978, nas coleções do INPA e do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Difere das demais espécies do gênero pela coloração do pronoto e morfologia da vésica do edeago.

O nome específico é alusivo aos habitantes de Manaus na língua tupi.

TYTHUS AMAZONICUS n. sp.
(Figs. 23-26)

Caracterizada pela coloração dos hemiélitros e morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 2,8 mm, largura 1,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,32 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,0 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,4 mm. **Pronoto:** comprimento 0,4 mm, largura na base 0,8 mm. **Cúneo:** comprimento 0,36 mm, largura na base 0,24 mm (holótipo).

Coloração geral pardo-amarela-da a ocrácea com manchas castanho-escuras; cabeça com mancha pálida na região mediana do vértice, margem posterior, pescoço e olhos castanho-escuros, clipeo e lados da face pálidos com pequena mancha longitudinal escura, jugo negro, base do clipeo negra, antena pálido-amarelada, segmento I com mancha mediana negra (as vezes apenas inferiormente).

Pronoto de coloração variável: pálido-amarelado em alguns exemplares ou com a região anterior do disco, inclusive os calos negros ou totalmente negro com apenas a região dos calos pálido-amarelada; mesoescuto pálido, com mancha negra mediana, escutelo castanho-escuro, apenas o extremo ápice pálido.

Hemiélitro pálido - amarelado, clavo (exceto base e extremo ápice) castanho, cório com mancha escura de cada lado formando uma figura de V com base arredondada e também um V pálido entre elas (Fig. 23) e a mancha escu-