

102. — *populi* (L.), selten gefunden, nach WAGNER nicht selten und verbreitet, auf Gebüsch und Laubbäumen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. verschieden häufig gefunden. Europäisch-maghribische Art.  
Fundorte: 77: Triglitz WAGNER (1939); 78: Finkenkrug VII 1894; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Schildow GREINER & SIEFKE (1933); 80: Lebus VII 68 SCHULZE; 81: Charlottenburg VII 14 GENNERICH, Luckenwalde VIII 68 HERTZEL, Pfaueninsel STICHEL (1926); 82: „Bin.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1914).
103. — *pseudopini* WAGN., nur zwei Funde, jedoch erst 1952 beschrieben, nach WAGNER (1961) zerstreut und selten, an Laubbäumen, nach WAGNER (1952) auch in Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.  
Fundorte: 81: Bochow ZELETZKI & RINNHOFFER 1966, Glindow ZELETZKI & RINNHOFFER 1966.
104. — *reuteri* SAUND., nur ein Neufund, nach WAGNER nicht selten und bes. im Norden verbreitet, an Laubhölzern, auch in Meckl. und Sa. gefunden. Europäische Art.  
Fundort: 78: Lehnitz VIII 63 KNAUSS.
105. — *tiliae* (F.), selten gefunden, nach WAGNER häufig und verbreitet, auf Laubbäumen (*Quercus*, *Tiliae*), auch in Meckl., Anh. und Sa. gefunden. Europäisch-maghribische Art.  
Fundorte: 77: Prignitz VIII 19 JAAP; 79: Pankow VIII 01 ENDERLEIN; 81: Bochow ZELETZKI & RINNHOFFER (1966), Grunewald IX 1899 OLDENBERG/VIII 19 HÖHNE, Werder VIII 24; 82: „Bin.“ BAERENSPRUNG, Friedrichshain VIII 19 HÖHNE.
106. — *insignis* REUT., nur ein Neufund auf *Calluna*, nach WAGNER nicht selten und verbreitet, in Heidegebieten, nur in Sa. gefunden. Europäische Art.  
Fundort: 81: Mittenwalde VII 66 u. 67 GÖLLNER.
107. — *ulmi* (L.), häufig und verbreitet, auf Laubhölzern, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. häufig gefunden. Europäisch-maghribische Art.  
Fundorte: 75: Fürstenberg VIII 1876 KONOW; 77: Prignitz VIII 19 JAAP, Tornow VII 41 GRIEP; 78: Bredow VII 38 LASS, Finkenkrug VII 19 HÖHNE, Hermsdorf VIII 44, Lehnitz VII 61 u. IX 62 KNAUSS; 79: Buckow SCHIRMER & SCHUMACHER (1911), Mühlenbeck VII 32, Rüdersdorf VII 30/VII–VIII 68 GIESE; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VIII 68 u. 70 GÖLLNER; 81: Dahlem VII 32 KUNIKE, Golm VII 41 GRIEP, Hermannswerder VII 41 GRIEP, Mittenwalde VIII 32 SIEFKE/VI 67 GÖLLNER, Pfaueninsel STICHEL (1926), Potsdam PAPE/VII 42 u. 46 GRIEP, Sperenberg VIII 30 LASS; 82: „Bin.“ BAERENSPRUNG/31 KUNIKE.
108. — *varipes* BOH., häufigste *Phytocoris*-Art, an Kräutern auf sonnigen und trockenen Standorten, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. häufig gefunden. Europäisch-maghribische Art.  
Fundorte: Ähnliche Fundorte wie bei *Ph. ulmi* (L.), jedoch häufiger und weiter verbreitet, so auch in 74: Geesow WAGNER (1941), Oderberg IX 71 DIECKMANN; 81: Glindow VIII 42 u. VII 53 GRIEP, Saarmund IX 52 GRIEP und 83: Spreewald VIII 58 WINKLER.
109. *Megacoelum beckeri* FIEB., selten gefunden, nach WAGNER nicht selten und weit verbreitet, an Nadelhölzern (*Pinus*), auch in Meckl., Anh. und Thür. selten, in Sa. nicht häufig gefunden. Europäische Art.  
Fundorte: 74: Geesow WAGNER (1941); 77: Prignitz VII 19 JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 78: Paulinenaue STICHEL (1936); 79: Rüdersdorf ENDERLEIN (1908)/SCHUMACHER (1913); 80: Frankfurt HEDICKE & MICHALK (1934), Gartz WAGNER (1941), Mescherin WAGNER (1941); 82: Rahnsdorf ENDERLEIN (1908)/SCHUMACHER (1913).
110. — *infusum* (H. S.), nicht selten gefunden, auf Laubbäumen (*Quercus*, *Alnus*), auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. gefunden. Europäische Art.  
Fundorte: 75: Fürstenberg VII 1880 KONOW; 77: Prignitz VIII 19 JAAP; 78: Finkenkrug VII 28; 80: Gartz WAGNER (1941), Lebus VIII 68–69 u. 71 GÖLLNER; 81: Glindow VIII 43 GRIEP, Hermannswerder VII 41 GRIEP, Potsdam VIII 42 GRIEP, Rehbrücke VIII 41 GRIEP, Werder VIII 44 GRIEP, Wildpark VIII 55 GRIEP; 82: „Bin.“ BAERENSPRUNG/SCHUMACHER (1914).
111. *Adelphocoris annulicornis* SAHLBG., selten gefunden, nach WAGNER zerstreut und weit verbreitet, meist auf *Urtica* an feuchteren Standorten, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. nicht häufig gefunden, Unterarten verschieden verbreitet. Europäisch-sibirische Art.  
Fundorte: 75: Fürstenberg VIII 1891 KONOW; 77: Prignitz JAAP, Triglitz WAGNER (1939); 80: Lebus VIII 30/VIII 67 u. VI 68 GÖLLNER; 81: Mittenwalde IX 65 GÖLLNER.
112. — *lineolatus* (GZ.), sehr häufige *Adelphocoris*-Art, VI–IX gefunden, an Leguminosen, an sonnigen Standorten, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. sehr häufig. Holarktische Art.  
Fundorte: Ähnliche Verbreitung wie *Stenodema*-Arten.
113. — *seticornis* (F.), häufig aber weniger häufig als *lineolatus* (GZ.), weit verbreitet, an Leguminosen (*Vicia* sp.) auf Wiesen, auch in Meckl., Anh., Thür. und Sa. verbreitet. Europäisch-sibirische Art.  
Fundorte: 75: Werbellinsee VIII 69 ECKERT; 77: Prignitz JAAP; 78: Finkenkrug V 20 OLDENBERG; 79: Hennickendorf IX 65 WENDT, Rüdersdorf VII 68 GIESE, Strausberg Torfhaus VII 65 GÖLLNER; 80: Lebus VI u. VIII 67 u. VI 68 u. VIII 69–71 GÖLLNER; Schiffmühle VII 69